図１　学童二次検尿判定基準

１）要受診

(1)　蛋白試験紙（２＋）以上またはP/C試験紙（２＋）
(2)　蛋白試験紙（１＋）以下でP/C試験紙（１＋）かつ沈渣軽度異常
(3)　沈渣高度異常
(4)　潜血（２＋）以上

２）要観察

(1)　蛋白試験紙（１＋）以下でＰ／Ｃ試験紙（１＋）かつ沈渣異常なし
(2)　P/C試験紙（希釈尿）

３）異常なし

(1)　P/C試験紙（normal）か（±）
(2)　潜血（１＋）で沈渣は異常なし、あるいは軽度異常
(3)　潜血（－）か（±）

沈渣基準

・沈渣高度異常

赤血球	20個/HPF以上	のいずれかあるもの
白血球	10個/HPF以上	
ガラス円柱	10個/WF以上	
顆粒円柱	５個/WF以上	
赤血球円柱	１個/WF以上	

・沈渣軽度異常

赤血球	10-19個/HPF	のいずれかあるもの
白血球	５－９個/HPF	
ガラス円柱	５－９個/WF	
顆粒円柱	３－４個/WF	

・沈渣異常なし

赤血球	０－９個/HPF
白血球	０－４個/HPF
ガラス円柱	０－４個/WF
顆粒円柱	０－２個/WF