


骨粗鬆症予防検査

表1 受診者・受診団体数

年 度	受 診 者 数			受診団体数	区分	受 診 者 数			受診団体数
	総数	男	女			総数	男	女	
14 年度	4 223	402	3 821	55	職域	1 994	276	1 718	40
					施設	2 229	126	2 103	15
13 年度	3 663	257	3 406	51	職域	1 321	178	1 143	34
					施設	2 342	79	2 263	17
12 年度	3 656	424	3 232	59	職域	1 503	334	1 169	42
					施設	2 153	90	2 063	17


職 域

図1-1 年齢階層別 STIFFNESS 平均値（男）（受診者数 276名）



男	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
受診者数	—	4	27	113	43	28	16	21	11	13
STIFFNESS 平均値	—	89.50	96.00	95.20	91.53	87.57	89.00	79.29	73.36	70.00
STIFFNESS SD	—	12.66	19.73	18.76	14.81	17.17	20.18	10.56	12.86	9.23
+1S	—	102.16	115.73	113.96	106.35	104.74	109.18	89.85	86.22	79.23
-1S	—	76.84	76.27	76.44	76.72	70.41	68.82	68.72	60.51	60.77

図1-2 年齢階層別 STIFFNESS 平均値（女）（受診者数 1 718名）



女	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
受診者数	—	39	202	222	219	161	218	326	270	61
STIFFNESS 平均値	—	89.10	88.08	85.67	83.15	82.76	81.01	75.44	68.92	64.90
STIFFNESS SD	—	14.42	13.29	15.14	12.71	13.49	12.96	10.85	9.71	8.92
+1S	—	103.53	101.37	100.81	95.86	96.25	93.98	86.29	78.64	73.82
-1S	—	74.68	74.80	70.53	70.43	69.28	68.05	64.59	59.21	55.99

表2 職域における総合判定別受診者数

総合判定	職 域					
	男 性	%	女 性	%	合 計	%
合 計	276	100.0	1 718	100.0	1 994	100.0
正 常 範 囲	181	65.6	846	49.2	1 027	51.5
要 注 意	72	26.1	645	37.5	717	36.0
要 受 診	22	8.0	198	11.5	220	11.0
要 治 療	—	—	5	0.3	5	0.3
受 診 継 続	1	0.4	24	1.4	25	1.3

施 設

図2-1 年齢階層別 STIFFNESS 平均値（男）（受診者数 126名）




図2-2 年齢階層別 STIFFNESS 平均値（女）（受診者数 2 103名）




表3 施設における総合判定別受診者数

総合判定	施 設						外 来		
	男 性	%	女 性	%	合 計	%	呼び出し対象者	受診者	%
合 計	126	100.0	2 103	100.0	2 229	100.0	939	585	62.3
① 異 常 な し	32	25.4	458	21.8	490	22.0	0	0	—
② 軽 度 注 意	0	—	2	0.1	2	0.1	2	0	—
③ 軽 度 注 意	37	29.4	546	26.0	583	26.2	6	6	100.0
④ 要 注 意	1	0.8	103	4.9	104	4.7	87	56	64.4
⑤ 要 注 意	32	25.4	488	23.2	520	23.3	319	196	61.4
⑥ 要 精 検	24	19.0	482	22.9	506	22.7	501	310	61.9
⑦ 要 治 療	0	—	24	1.1	24	1.1	24	17	70.8