

一 般 健 康 診 断

表 1 一般健康診断等の種類別受診者及び受診団体数

1-1 一般健康診断

区 分	総 数		一 般 健 康 診 断					一般健康診断時に行うその他の健診		
	受診者	受診団体	全項目等 ¹⁾	省略項目等 ²⁾	その他	雇入れ時	計	総合健診 ³⁾	婦人健診 ⁴⁾	その他の ⁵⁾ 検診・検査
15 年 度	251 091	2 349	77 846	55 295	51 578	4 933	189 652	42 132	843	18 464
14 年 度	261 887	2 672	71 155	56 928	58 204	6 636	192 923	48 785	1 610	18 569
13 年 度	276 838	3 029	88 470	62 454	51 130	7 308	209 362	41 371	1 140	24 965

※ 受診者は延数、受診団体は実数（代表団体）

1) 全項目とは労働安全衛生規則で定められた35歳及び40歳以上の者の健診及び項目を追加して実施した健診

2) 省略項目とは労働安全衛生規則で認められた一部項目を省略して行った健診及び項目を追加して実施した健診

3) 総合健診とは一般健診に消化器検診を加えて行った健診

4) 婦人健診とは女性を対象とした協会のセット健診(子宮がん、乳がん、循環器、貧血など20項目)但し、子宮がん、乳がん検診結果については別掲

5) その他の検診・検査とは健康診断項目の一部を受託して実施した検診検査

1-2 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診

区分	総 数		一 般 健 診	日 帰 り 人 間 ド ッ ク	乳がん・ 子宮がん検診	付 加 健 診	フォローアップ 健 診
	受診者数	受診団体					
15 年 度	16 263	1 510	15 980	－	283	181	137
14 年 度	14 728	1 635	14 490	－	238	101	132
13 年 度	13 743	1 200	12 692	907	144	－	65

表 2 胸部X線検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		年 1 回 観 察		要 経 過 観 察		要 二 次 検 査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	25 205	24 451	97.0	530	2.1	37	0.1	183	0.7	2	0.0	2	0.0
30 ～ 39	41 504	39 255	94.6	1 692	4.1	214	0.5	323	0.8	14	0.0	6	0.0
40 ～ 49	25 245	23 172	91.8	1 474	5.8	370	1.5	214	0.8	7	0.0	8	0.0
50 ～ 59	26 561	22 805	85.9	2 477	9.3	880	3.3	378	1.4	4	0.0	17	0.1
60 歳 ～	13 158	10 185	77.4	1 898	14.4	658	5.0	389	3.0	13	0.1	15	0.1
計	131 673	119 868	91.0	8 071	6.1	2 159	1.6	1 487	1.1	40	0.0	48	0.0

女

区 分	受診者	異常なし		年 1 回 観 察		要 経 過 観 察		要 二 次 検 査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 244	15 980	98.4	161	1.0	12	0.1	86	0.5	3	0.0	2	0.0
30 ～ 39	16 511	16 023	97.0	319	1.9	90	0.5	75	0.5	4	0.0	－	－
40 ～ 49	14 393	13 603	94.5	496	3.4	207	1.4	83	0.6	4	0.0	－	－
50 ～ 59	17 053	15 274	89.6	1 105	6.5	478	2.8	185	1.1	7	0.0	4	0.0
60 歳 ～	7 041	5 691	80.8	820	11.6	350	5.0	166	2.4	11	0.2	3	0.0
計	71 242	66 571	93.4	2 901	4.1	1 137	1.6	595	0.8	29	0.0	9	0.0

※ 心臓、大動脈等の異常で呼吸器系として問題のない所見は除く

表3 血圧検査結果
男

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	27 111	118.2	12.3	69.8	9.1	26 015	96.0	871	3.2	225	0.8
30～39	47 759	120.3	12.8	74.3	9.9	43 883	91.9	2 780	5.8	1 096	2.3
40～49	29 223	123.4	14.8	79.0	10.9	24 110	82.5	3 327	11.4	1 786	6.1
50～59	30 351	129.6	16.7	82.0	10.8	21 315	70.2	5 934	19.6	3 102	10.2
60歳～	12 882	134.1	17.3	81.5	10.4	8 246	64.0	3 153	24.5	1 483	11.5
計	147 326	123.6	15.3	76.6	11.1	123 569	83.9	16 065	10.9	7 692	5.2

女

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	16 647	107.9	11.0	64.4	8.0	16 548	99.4	80	0.5	19	0.1
30～39	18 047	110.4	12.1	67.5	8.9	17 694	98.0	257	1.4	96	0.5
40～49	14 868	116.2	15.1	72.2	10.5	13 701	92.2	794	5.3	373	2.5
50～59	16 753	123.0	17.3	76.0	10.9	14 012	83.6	1 918	11.4	823	4.9
60歳～	5 777	128.3	18.2	76.7	10.5	4 425	76.6	975	16.9	377	6.5
計	72 092	115.4	16.0	70.5	10.7	66 380	92.1	4 024	5.6	1 688	2.3

表4 肥満度
男

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～21		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	27 158	2.6	15.4	561	2.1	3 966	14.6	16 430	60.5	3 239	11.9	1 521	5.6	1 441	5.3
30～39	47 762	7.1	15.3	434	0.9	3 853	8.1	26 982	56.5	8 756	18.3	4 193	8.8	3 544	7.4
40～49	29 175	8.7	14.3	247	0.8	1 672	5.7	15 508	53.2	6 465	22.2	3 252	11.1	2 031	7.0
50～59	30 192	7.5	12.9	247	0.8	1 774	5.9	16 843	55.8	7 020	23.3	2 918	9.7	1 390	4.6
60歳～	12 837	7.0	12.2	127	1.0	737	5.7	7 256	56.5	3 104	24.2	1 172	9.1	441	3.4
計	147 124	6.7	14.6	1 616	1.1	12 002	8.2	83 019	56.4	28 584	19.4	13 056	8.9	8 847	6.0

女

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～21		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	16 597	－6.1	13.1	1 206	7.3	5 602	33.8	8 360	50.4	763	4.6	321	1.9	345	2.1
30～39	17 971	－3.2	15.3	924	5.1	5 215	29.0	9 341	52.0	1 222	6.8	570	3.2	699	3.9
40～49	14 759	1.0	15.3	396	2.7	2 681	18.2	8 656	58.6	1 478	10.0	818	5.5	730	4.9
50～59	16 695	3.0	14.3	329	2.0	2 204	13.2	9 955	59.6	2 358	14.1	1 096	6.6	753	4.5
60歳～	5 760	4.5	14.1	109	1.9	614	10.7	3 384	58.8	935	16.2	429	7.4	289	5.0
計	71 782	－0.9	14.9	2 964	4.1	16 316	22.7	39 696	55.3	6 756	9.4	3 234	4.5	2 816	3.9

※ 肥満度：BMI（Body Mass Index）が22となる場合を標準として算出した

$$\text{肥満度} = \frac{\text{体重実測値} - \text{標準体重}}{\text{標準体重}} (\%)$$

表5 貧血検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 263	15 687	96.5	41	0.3	494	3.0	23	0.1	12	0.1	6	0.0
30 ～ 39	33 794	32 521	96.2	101	0.3	1 077	3.2	66	0.2	21	0.1	8	0.0
40 ～ 49	25 086	23 772	94.8	21	0.1	1 117	4.5	116	0.5	39	0.2	21	0.1
50 ～ 59	26 253	24 353	92.8	22	0.1	1 563	6.0	176	0.7	96	0.4	43	0.2
60 歳 ～	11 576	10 564	91.3	3	0.0	763	6.6	134	1.2	70	0.6	42	0.4
計	112 972	106 897	94.6	188	0.2	5 014	4.4	515	0.5	238	0.2	120	0.1

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	9 342	8 650	92.6	15	0.2	383	4.1	178	1.9	85	0.9	31	0.3
30 ～ 39	14 520	12 495	86.1	43	0.3	1 292	8.9	381	2.6	220	1.5	89	0.6
40 ～ 49	14 352	11 571	80.6	24	0.2	1 307	9.1	623	4.3	542	3.8	285	2.0
50 ～ 59	16 166	14 764	91.3	14	0.1	857	5.3	194	1.2	185	1.1	152	0.9
60 歳 ～	5 633	5 378	95.5	1	0.0	197	3.5	33	0.6	7	0.1	17	0.3
計	60 013	52 858	88.1	97	0.2	4 036	6.7	1 409	2.3	1 039	1.7	574	1.0

※ 血色素量・赤血球数を実施している者を対象とする

表6 肝機能検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 684	12 922	77.5	84	0.5	2 221	13.3	1 374	8.2	68	0.4	15	0.1
30 ～ 39	34 845	22 469	64.5	407	1.2	7 318	21.0	4 244	12.2	265	0.8	142	0.4
40 ～ 49	25 741	14 589	56.7	100	0.4	6 876	26.7	3 717	14.4	209	0.8	250	1.0
50 ～ 59	27 068	15 671	57.9	31	0.1	7 462	27.6	3 271	12.1	258	1.0	375	1.4
60 歳 ～	11 889	7 641	64.3	—	—	2 755	23.2	1 218	10.2	63	0.5	212	1.8
計	116 227	73 292	63.1	622	0.5	26 632	22.9	13 824	11.9	863	0.7	994	0.9

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	94 56	9 117	96.4	3	0.0	250	2.6	76	0.8	7	0.1	3	0.0
30 ～ 39	14 424	13 616	94.4	12	0.1	587	4.1	184	1.3	15	0.1	10	0.1
40 ～ 49	14 364	13 120	91.3	2	0.0	963	6.7	234	1.6	27	0.2	18	0.1
50 ～ 59	16 480	13 401	81.3	3	0.0	2 348	14.2	616	3.7	41	0.2	71	0.4
60 歳 ～	5 710	4 662	81.6	—	—	801	14.0	195	3.4	6	0.1	46	0.8
計	60 434	53 916	89.2	20	0.0	4 949	8.2	1 305	2.2	96	0.2	148	0.2

※ GOT、GPT、 γ -GTPについて検査した者を対象とする

表7 脂質検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	15 941	11 412	71.6	109	0.7	3 795	23.8	541	3.4	74	0.5	10	0.1
30 ～ 39	31 553	17 979	57.0	458	1.5	10 031	31.8	2 448	7.8	466	1.5	171	0.5
40 ～ 49	24 968	11 684	46.8	71	0.3	9 709	38.9	2 647	10.6	486	1.9	371	1.5
50 ～ 59	26 141	12 036	46.0	41	0.2	10 816	41.4	2 257	8.6	422	1.6	569	2.2
60 歳 ～	11 458	5 579	48.7	4	0.0	4 573	39.9	876	7.6	111	1.0	315	2.7
計	110 061	58 690	53.3	683	0.6	38 924	35.4	8 769	8.0	1 559	1.4	1 436	1.3

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	9 155	7540	82.4	93	1.0	1 379	15.1	112	1.2	28	0.3	3	0.0
30 ～ 39	11 845	9 305	78.6	117	1.0	2 098	17.7	256	2.2	57	0.5	12	0.1
40 ～ 49	14 031	9 277	66.1	35	0.2	4 006	28.6	570	4.1	73	0.5	70	0.5
50 ～ 59	15 791	6 998	44.3	14	0.1	6 571	41.6	1 594	10.1	255	1.6	359	2.3
60 歳 ～	5 555	2 112	38.0	1	0.0	2 389	43.0	615	11.1	76	1.4	362	6.5
計	56 377	35 232	62.5	260	0.5	16 443	29.2	3 147	5.6	489	0.9	806	1.4

※ 総コレステロール, HDLコレステロール, トリグリセライドについて検査した者を対象とする

表8 選別聴力検査結果
男

区 分	総 数		年 齢									
			～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数	93 610	100.0	9 543	100.0	21 760	100.0	25 113	100.0	26 100	100.0	11 094	100.0
所 見 あり 総 数	15 375	16.4	176	1.8	789	3.6	2 379	9.5	6 795	26.0	5 236	47.2
1 K H z の み	1 555	1.7	64	0.7	154	0.7	318	1.3	649	2.5	370	3.3
4 K H z の み	10 102	10.8	63	0.7	460	2.1	1 594	6.3	4 795	18.4	3 190	28.8
1,4 K H z と も	3 718	4.0	49	0.5	175	0.8	467	1.9	1 351	5.2	1 676	15.1
所 見 な し	78 235	83.6	9 367	98.2	20 971	96.4	22 734	90.5	19 305	74.0	5 858	52.8

女

区 分	総 数		年 齢									
			～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数	49 062	100.0	6 618	100.0	9 404	100.0	13 338	100.0	14 731	100.0	4 971	100.0
所 見 あり 総 数	3 082	6.3	83	1.3	167	1.8	445	3.3	1246	8.5	1 141	23.0
1 K H z の み	1 042	2.1	33	0.5	54	0.6	181	1.4	451	3.1	323	6.5
4 K H z の み	909	1.9	19	0.3	51	0.5	107	0.8	355	2.4	377	7.6
1,4 K H z と も	1 131	2.3	31	0.5	62	0.7	157	1.2	440	3.0	441	8.9
所 見 な し	45 980	93.7	6 535	98.7	9 237	98.2	12 893	96.7	13 485	91.5	3 830	77.0

表9 心電図検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	10 403	8 016	77.1	2 096	20.1	267	2.6	2	0.0	14	0.1	8	0.1
30 ～ 39	24 112	19 367	80.3	3 760	15.6	860	3.6	17	0.1	60	0.2	48	0.2
40 ～ 49	26 039	20 505	78.7	3 726	14.3	1 494	5.7	91	0.3	103	0.4	120	0.5
50 ～ 59	27 026	18 879	69.9	4 331	16.0	2 994	11.1	140	0.5	270	1.0	412	1.5
60 歳 ～	11 881	6 950	58.5	2 294	19.3	1 934	16.3	49	0.4	213	1.8	441	3.7
計	99 461	73 717	74.1	16 207	16.3	7 549	7.6	299	0.3	660	0.7	1 029	1.0

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	6 175	5 194	84.1	840	13.6	133	2.2	1	0.0	4	0.1	3	0.0
30 ～ 39	9 747	8 235	84.5	1 195	12.3	285	2.9	12	0.1	8	0.1	12	0.1
40 ～ 49	14 637	12 296	84.0	1 704	11.6	562	3.8	28	0.2	23	0.2	24	0.2
50 ～ 59	16 525	12 761	77.2	2 349	14.2	1 225	7.4	45	0.3	62	0.4	83	0.5
60 歳 ～	5 692	3 757	66.0	1 097	19.3	695	12.2	10	0.2	38	0.7	95	1.7
計	52 776	42 243	80.0	7 185	13.6	2 900	5.5	96	0.2	135	0.3	217	0.4

表10 眼底検査結果

男

女

区 分	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV
～29歳	370	362	8	—	—	—	—	—	—	379	378	1	—	—	—	—	—	—
30～39	3 971	3 783	183	—	4	—	1	—	—	1 975	1 933	42	—	—	—	—	—	—
40～49	8 739	7 050	1 640	—	38	2	9	—	—	4 527	3 993	517	—	12	—	5	—	—
50～59	9 545	5 029	4 289	—	183	11	33	—	—	5 239	3 354	1 822	—	51	1	11	—	—
60歳～	3 299	1 059	2 066	—	144	10	20	—	—	1 873	688	1 106	—	66	2	11	—	—
計	25 924	17 283	8 186	—	369	23	63	—	—	13 993	10 346	3 488	—	129	3	27	—	—

表11 糖代謝検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	15 227	15 033	98.7	68	0.4	46	0.3	50	0.3	26	0.2	4	0.0
30 ～ 39	30 466	29 428	96.6	185	0.6	275	0.9	278	0.9	197	0.6	103	0.3
40 ～ 49	24 664	22 577	91.5	137	0.6	516	2.1	635	2.6	461	1.9	338	1.4
50 ～ 59	25 671	21 233	82.7	235	0.9	1 006	3.9	1 337	5.2	908	3.5	952	3.7
60 歳 ～	11 305	8 844	78.2	103	0.9	419	3.7	795	7.0	470	4.2	674	6.0
計	107 333	97 115	90.5	728	0.7	2 262	2.1	3 095	2.9	2 062	1.9	2 071	1.9

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	8 653	8 550	98.8	26	0.3	33	0.4	29	0.3	10	0.1	5	0.1
30 ～ 39	11 473	11 277	98.3	29	0.3	54	0.5	64	0.6	29	0.3	20	0.2
40 ～ 49	13 651	13 216	96.8	28	0.2	121	0.9	159	1.2	70	0.5	57	0.4
50 ～ 59	15 439	14 397	93.3	16	0.1	292	1.9	371	2.4	185	1.2	178	1.2
60 歳 ～	5 502	4 893	88.9	9	0.2	183	3.3	178	3.2	114	2.1	125	2.3
計	54 718	52 333	95.6	108	0.2	683	1.2	801	1.5	408	0.7	385	0.7

<参 考>

労働安全衛生規則第52条（様式第6号）報告する際の「有所見」の数え方

1	聴力検査（オーディオメータ）	左右の1000Hz, 4000Hzのいずれかで、規定レベルの音を聴取できず「所見あり」となった者
2	聴力検査（その他の方法）	会話聴力で異常の認められた者、及び補聴器使用中の者
3	胸部エックス線検査	「異常なし」と判定された以外の者（肺、胸膜の治癒所見を含む）
4	喀痰検査	「異常なし」と判定された以外の者
5	血圧検査	(1) 収縮期血圧 140mmHg以上の者 (2) 拡張期血圧 90mmHg以上の者
6	貧血検査	血色素量が男で12.9g/dℓ以下、女で11.4g/dℓ以下の者
7	肝機能検査	(1) GOT 34IU/ℓ以上 (2) GPT 31IU/ℓ以上 (3) γ-GTP 75IU/ℓ以上の者
8	血中脂質検査	(1) 総コレステロール 130～219mg/dℓ以外の者 (2) HDLコレステロール 39mg/dℓ以下の者 (3) トリグリセライド 150mg/dℓ以上の者
9	血糖検査	(1) 空腹時血糖 110mg/dℓ以上の者 (2) 随時血糖 140mg/dℓ以上の者 (3) HbA1C 5.9%以上の者
10	尿検査（糖）	+以上の者。（±は除く）
11	尿検査（蛋白）	+以上の者。（±は除く）
12	心電図検査	判定において「異常なし」「心配なし」以外の者
13	所見のあった者の人数	上記1～12の各項において、「有所見」となった者の実人数
14	医師の指示人数	総合判定において、「要二次検査（要精検・再検）」「要受診」「受診中」とされた者

表12- 1 年齢階層別有所見者数及び有所見率(男性)

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		831	29 206	53 514	34 223	34 776	13 051	978	16 6579
有所見者数		123	8 571	24 138	20 780	23 697	9 378	755	87 442
有所見率		14.8%	29.3%	45.1%	60.7%	68.1%	71.9%	77.2%	52.5%
医師の指示人数		50	2516	8 298	8731	11 643	5 591	464	37 293
指示率		6.0%	8.6%	15.5%	25.5%	33.5%	42.8%	47.4%	22.4%
聴力 (1000Hz)	実施者数	216	10 145	22 650	25 815	26 651	10 566	748	9 6791
	有所見者数	1	70	192	489	1 268	1 235	182	3437
	有所見率	0.5%	0.7%	0.8%	1.9%	4.8%	11.7%	24.3%	3.6%
聴力 (4000Hz)	実施者数	216	10 145	22 650	25 815	26 651	10 566	748	96 791
	有所見者数	1	72	398	1 445	4 528	3 291	417	10 152
	有所見率	0.5%	0.7%	1.8%	5.6%	17.0%	31.1%	55.7%	10.5%
聴力その他	実施者数	438	16 845	25 748	4 548	4 394	1 375	50	53 398
	有所見者数	－	31	60	8	9	6	1	115
	有所見率	－	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	2.0%	0.2%
胸部X線	実施者数	661	24 534	41 482	24 981	26 232	11 010	879	12 9779
	有所見者数	18	747	2 452	2 423	4 430	2 863	395	13 328
	有所見率	2.7%	3.0%	5.9%	9.7%	16.9%	26.0%	44.9%	10.3%
血圧	実施者数	648	27 426	49 752	30 785	31 604	12 318	890	15 3423
	有所見者数	19	1 108	4 048	5 326	9 337	4 355	365	24 558
	有所見率	2.9%	4.0%	8.1%	17.3%	29.5%	35.4%	41.0%	16.0%
貧血	実施者数	247	17 219	36 681	27 130	27 994	11 049	854	12 1174
	有所見者数	1	93	237	410	834	554	94	2 223
	有所見率	0.4%	0.5%	0.6%	1.5%	3.0%	5.0%	11.0%	1.8%
肝機能	実施者数	226	17 256	36 556	26 777	27 679	11 117	873	120 484
	有所見者数	33	3 721	12 265	10 498	9 894	3 450	215	40 076
	有所見率	14.6%	21.6%	33.6%	39.2%	35.7%	31.0%	24.6%	33.3%
血中脂質	実施者数	225	16 793	35 512	26 349	27 337	11 064	834	118 114
	有所見者数	51	4574	14 868	13 787	14 563	5 591	390	53 824
	有所見率	22.7%	27.2%	41.9%	52.3%	53.3%	50.5%	46.8%	45.6%
血糖	実施者数	217	15 654	31 930	25 951	26 877	10 657	800	112 086
	有所見者数	1	130	887	2 114	4507	2128	169	9 936
	有所見率	0.5%	0.8%	2.8%	8.1%	16.8%	20.0%	21.1%	8.9%
尿糖	実施者数	759	28 235	49 748	30 658	31 375	12 261	918	153 954
	有所見者数	9	207	853	1 015	2 004	881	68	5 037
	有所見率	1.2%	0.7%	1.7%	3.3%	6.4%	7.2%	7.4%	3.3%
尿蛋白	実施者数	759	28 259	49 786	30 665	31 378	12 262	918	154 027
	有所見者数	16	453	826	860	1346	660	54	4215
	有所見率	2.1%	1.6%	1.7%	2.8%	4.3%	5.4%	5.9%	2.7%
心電図	実施者数	246	10 151	24 096	26 030	27 023	11 054	832	99 432
	有所見者数	3	288	998	1 852	3 873	2 405	260	9 679
	有所見率	1.2%	2.8%	4.1%	7.1%	14.3%	21.8%	31.3%	9.7%

表12- 2 年齢階層別有所見者数及び有所見率(女性)

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		930	18 373	21 080	17 633	19 303	5 800	525	83 644
有所見者数		93	2 998	5 536	8 079	12 597	4 264	378	33 945
有所見率		10.0%	16.3%	26.3%	45.8%	65.3%	73.5%	72.0%	40.6%
医師の指示人数		70	1 097	1 821	3 133	4 986	2 098	196	13 401
指示率		7.5%	6.0%	8.6%	17.8%	25.8%	36.2%	37.3%	16.0%
聴力（1000Hz）	実施者数	142	6 735	9 810	13 749	15 165	4 730	335	50 666
	有所見者数	2	31	81	223	597	448	87	1 469
	有所見率	1.4%	0.5%	0.8%	1.6%	3.9%	9.5%	26.0%	2.9%
聴力（4000Hz）	実施者数	142	6 735	9 810	13 749	15 165	4 730	335	50 666
	有所見者数	2	23	81	169	485	424	79	1 263
	有所見率	1.4%	0.3%	0.8%	1.2%	3.2%	9.0%	23.6%	2.5%
聴力その他	実施者数	692	10 065	8 932	1 406	1 290	236	14	22 635
	有所見者数	－	9	23	2	1	－	－	35
	有所見率	－	0.1%	0.3%	0.1%	0.1%	－	－	0.2%
胸部X線	実施者数	761	15 482	16 494	13 913	16 078	5 247	489	68 464
	有所見者数	7	262	529	916	1 997	1 010	167	4 888
	有所見率	0.9%	1.7%	3.2%	6.6%	12.4%	19.2%	34.2%	7.1%
血圧	実施者数	836	16 952	19 487	15 802	17 641	5 505	415	76 638
	有所見者数	4	98	369	1 212	2 872	1 257	121	5 933
	有所見率	0.5%	0.6%	1.9%	7.7%	16.3%	22.8%	29.2%	7.7%
貧血	実施者数	602	11 739	16 071	14 905	16 673	5 326	423	65 739
	有所見者数	28	735	1571	2291	875	109	18	5 627
	有所見率	4.7%	6.3%	9.8%	15.4%	5.2%	2.0%	4.3%	8.6%
肝機能	実施者数	110	10 273	15 495	14 850	16 702	5 335	421	63 186
	有所見者数	5	278	622	920	2049	715	47	4 636
	有所見率	4.5%	2.7%	4.0%	6.2%	12.3%	13.4%	11.2%	7.3%
血中脂質	実施者数	107	10 095	15 289	14 776	16 664	5 322	405	62 658
	有所見者数	9	1 211	2 558	4 319	9 307	3 344	243	20 991
	有所見率	8.4%	12.0%	16.7%	29.2%	55.9%	62.8%	60.0%	33.5%
血糖	実施者数	107	9 142	12 258	14 296	15 930	5 134	402	57 269
	有所見者数	3	74	175	422	1 059	499	54	2 286
	有所見率	2.8%	0.8%	1.4%	3.0%	6.6%	9.7%	13.4%	4.0%
尿糖	実施者数	877	17 527	19 421	15 690	17 584	5 501	424	77 024
	有所見者数	13	91	150	146	221	96	3	720
	有所見率	1.5%	0.5%	0.8%	0.9%	1.3%	1.7%	0.7%	0.9%
尿蛋白	実施者数	877	17 543	19 448	15 697	17 591	5 501	424	77 081
	有所見者数	27	465	335	268	313	110	8	1526
	有所見率	3.1%	2.7%	1.7%	1.7%	1.8%	2.0%	1.9%	2.0%
心電図	実施者数	100	6 089	9 767	14 640	16 527	5 298	400	5 2821
	有所見者数	6	138	320	646	1 444	764	85	3 403
	有所見率	6.0%	2.3%	3.3%	4.4%	8.7%	14.4%	21.3%	6.4%