

一 般 健 康 診 断

表 1 一般健康診断等の種類別受診者及び受診団体数

1-1 一般健康診断

区 分	総 数		一 般 健 康 診 断					一般健康診断時に行うその他の健診		
	受診者	受診団体	全項目等 ¹⁾	省略項目等 ²⁾	その他	雇入れ時	計	総合健診 ³⁾	婦人健診 ⁴⁾	その他の ⁵⁾ 検診・検査
16 年 度	265 103	2 240	84 066	62 956	48 007	7 501	202 530	41 864	761	19 948
15 年 度	251 091	2 349	77 846	55 295	51 578	4 933	189 652	42 132	843	18 464
14 年 度	261 887	2 672	71 155	56 928	58 204	6 636	192 923	48 785	1 610	18 569

※受診者は延数、受診団体は実数（代表団体）

1) 全項目とは労働安全衛生規則で定められた35歳及び40歳以上の者の健診及び項目を追加して実施した健診

2) 省略項目とは労働安全衛生規則で認められた一部項目を省略して行った健診及び項目を追加して実施した健診

3) 総合健診とは一般健診に消化器検診を加えて行った健診

4) 婦人健診とは女性を対象とした協会のセット健診(子宮がん、乳がん、循環器、貧血など20項目)但し、子宮がん、乳がん検診結果については別掲

5) その他の検診・検査とは健康診断項目の一部を受託して実施した検診検査

1-2 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診

区分	総 数		一 般 健 診	日 帰 り 人間ドック	乳がん・ 子宮がん検診	付 加 健 診	フォローアップ 健 診
	受診者数	受診団体					
16 年 度	17 702	1 863	17 258	—	444	287	139
15 年 度	16 263	1 510	15 980	—	283	181	137
14 年 度	14 728	1 635	14 490	—	238	101	132

表 2 胸部X線検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		年 1 回 観 察		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	28 021	27 774	99.1	26	0.1	42	0.1	171	0.6	4	0.0	4	0.0
30 ～ 39	40 543	39 813	98.2	288	0.7	212	0.5	215	0.5	11	0.0	4	0.0
40 ～ 49	24 445	23 437	95.9	468	1.9	364	1.5	167	0.7	3	0.0	6	0.0
50 ～ 59	24 154	22 180	91.8	804	3.3	866	3.6	285	1.2	6	0.0	13	0.1
60 歳 ～	10 104	8 765	86.7	752	7.4	348	3.4	224	2.2	5	0.0	10	0.1
計	127 267	121 969	95.8	2 338	1.8	1 832	1.4	1 062	0.8	29	0.0	37	0.0

女

区 分	受診者	異常なし		年 1 回 観 察		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	18 431	18 320	99.4	8	0.0	20	0.1	77	0.4	—	—	6	0.0
30 ～ 39	17 180	16 943	98.6	64	0.4	91	0.5	78	0.5	3	0.0	1	0.0
40 ～ 49	14 119	13 644	96.6	179	1.3	219	1.6	75	0.5	—	—	2	0.0
50 ～ 59	14 825	13 890	93.7	377	2.5	429	2.9	119	0.8	4	0.0	6	0.0
60 歳 ～	5 064	4 710	93.0	161	3.2	89	1.8	101	2.0	—	—	3	0.1
計	69 619	67 507	97.0	789	1.1	848	1.2	450	0.6	7	0.0	18	0.0

※心臓、大動脈等の異常で呼吸器系として問題のない所見は除く

表3 血圧検査結果
男

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	31 237	118.3	12.2	69.4	9.1	30 099	96.4	907	2.9	231	0.7
30～39	49 324	120.1	12.7	74.0	9.9	45 585	92.4	2 630	5.3	1 109	2.2
40～49	31 046	122.9	14.4	78.4	10.8	26 029	83.8	3 284	10.6	1 733	5.6
50～59	31 077	128.9	16.6	81.3	10.7	22 480	72.3	5 735	18.5	2 862	9.2
60歳～	13 388	133.4	17.1	80.8	10.3	8 936	66.7	3 080	23.0	1 372	10.2
計	156 072	123.2	15.0	76.0	11.0	133 129	85.3	15 636	10.0	7 307	4.7

女

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	19 313	107.9	10.8	63.9	7.9	19 213	99.5	85	0.4	15	0.1
30～39	19 185	109.8	12.0	66.7	8.9	18 848	98.2	241	1.3	96	0.5
40～49	15 554	115.2	15.1	71.2	10.4	14 499	93.2	710	4.6	345	2.2
50～59	16 585	122.1	17.3	75.1	10.8	14 056	84.8	1 787	10.8	742	4.5
60歳～	6 003	127.2	17.8	76.0	10.4	4 769	79.4	897	14.9	337	5.6
計	76 640	114.4	15.6	69.5	10.6	71 385	93.1	3 720	4.9	1 535	2.0

表4 肥満度
男

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～-21		-20～-11		-10～10		11～20		21～30		31～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	31 223	2.6	15.2	597	1.9	4 359	14.0	19 242	61.6	3 811	12.2	1 667	5.3	1 547	5.0
30～39	49 211	6.9	15.4	496	1.0	4 068	8.3	28 027	57.0	8 726	17.7	4 268	8.7	3 626	7.4
40～49	30 928	8.6	14.5	261	0.8	1 899	6.1	16 372	52.9	6 728	21.8	3 395	11.0	2 273	7.3
50～59	30 905	7.6	13.0	257	0.8	1 828	5.9	17 158	55.5	7 118	23.0	3 106	10.1	1 438	4.7
60歳～	13 320	6.8	12.2	140	1.1	809	6.1	7 568	56.8	3 144	23.6	1 197	9.0	462	3.5
計	155 587	6.5	14.6	1 751	1.1	12 963	8.3	88 367	56.8	29 527	19.0	13 633	8.8	9 346	6.0

女

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～-21		-20～-11		-10～10		11～20		21～30		31～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	19 249	-5.5	13.1	1 289	6.7	6 171	32.1	10 029	52.1	986	5.1	353	1.8	421	2.2
30～39	18 878	-3.4	15.3	1 091	5.8	5 580	29.6	9 600	50.9	1 194	6.3	634	3.4	779	4.1
40～49	15 171	0.5	15.5	438	2.9	3 028	20.0	8 745	57.6	1 452	9.6	750	4.9	758	5.0
50～59	16 515	2.7	14.6	383	2.3	2 304	14.0	9 796	59.3	2 201	13.3	1 073	6.5	758	4.6
60歳～	5 987	4.1	14.0	120	2.0	658	11.0	3 552	59.3	941	15.7	444	7.4	272	4.5
計	75 800	-1.2	14.9	3 321	4.4	17 741	23.4	41 722	55.0	6 774	8.9	3 254	4.3	2 988	3.9

※肥満度：BMI (Body Mass Index) が22となる場合を標準として算出した
標準体重身長(m)²×2

$$\text{肥満度} = \frac{\text{体重実測値} - \text{標準体重}}{\text{標準体重}} (\%)$$

表5 貧血検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	17 218	16 542	96.1	49	0.3	594	3.4	20	0.1	11	0.1	2	0.0
30 ～ 39	36 239	34 766	95.9	92	0.3	1 296	3.6	56	0.2	20	0.1	9	0.0
40 ～ 49	26 936	25 549	94.9	28	0.1	1 219	4.5	90	0.3	36	0.1	14	0.1
50 ～ 59	27 301	25 285	92.6	17	0.1	1 716	6.3	165	0.6	78	0.3	40	0.1
60 歳 ～	11 869	10 895	91.8	—	—	767	6.5	104	0.9	65	0.5	38	0.3
計	119 563	113 037	94.5	186	0.2	5 592	4.7	435	0.4	210	0.2	103	0.1

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	10 313	9 594	93.0	7	0.1	429	4.2	152	1.5	87	0.8	44	0.4
30 ～ 39	15 579	13 706	88.0	30	0.2	1 141	7.3	387	2.5	228	1.5	87	0.6
40 ～ 49	14 592	11 990	82.2	22	0.2	1 276	8.7	580	4.0	481	3.3	243	1.7
50 ～ 59	16 018	14 673	91.6	14	0.1	853	5.3	191	1.2	140	0.9	147	0.9
60 歳 ～	5 818	5 567	95.7	—	—	189	3.2	32	0.6	11	0.2	19	0.3
計	62 320	55 530	89.1	73	0.1	3 888	6.2	1 342	2.2	947	1.5	540	0.9

※血色素量・赤血球数を実施している者を対象とする

表6 肝機能検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	17 398	13 635	78.4	65	0.4	2402	13.8	1232	7.1	46	0.3	18	0.1
30 ～ 39	36 611	23 947	65.4	297	0.8	7707	21.1	4350	11.9	180	0.5	130	0.4
40 ～ 49	27 118	15 594	57.5	106	0.4	7307	26.9	3695	13.6	177	0.7	239	0.9
50 ～ 59	27 547	16 213	58.9	51	0.2	7553	27.4	3171	11.5	213	0.8	346	1.3
60 歳 ～	12 017	7 847	65.3	8	0.1	2822	23.5	1121	9.3	40	0.3	179	1.5
計	120 691	77 236	64.0	527	0.4	27 791	23.0	13 569	11.2	656	0.5	912	0.8

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	10 364	10 008	96.6	8	0.1	269	2.6	74	0.7	4	0.0	1	0.0
30 ～ 39	15 586	14 679	94.2	7	0.0	666	4.3	216	1.4	12	0.1	6	0.0
40 ～ 49	14 704	13 463	91.6	5	0.0	973	6.6	233	1.6	15	0.1	15	0.1
50 ～ 59	16 145	13 408	83.0	1	0.0	2 152	13.3	503	3.1	23	0.1	58	0.4
60 歳 ～	5 840	4 877	83.5	—	—	747	12.8	173	3.0	5	0.1	38	0.7
計	62 639	56 435	90.1	21	0.0	4 807	7.7	1 199	1.9	59	0.1	118	0.2

※GOT、GPT、 γ -GTPについて検査した者を対象とする

表7 脂質検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 856	12 060	71.5	113	0.7	4 071	24.2	509	3.0	78	0.5	25	0.1
30 ～ 39	33 761	19 535	57.9	335	1.0	10 878	32.2	2 387	7.1	445	1.3	181	0.5
40 ～ 49	26 878	12 533	46.6	61	0.2	10 664	39.7	2 708	10.1	505	1.9	407	1.5
50 ～ 59	27 291	12 488	45.8	41	0.2	11 233	41.2	2 506	9.2	406	1.5	617	2.3
60 歳 ～	11 789	5 741	48.7	2	0.0	4 742	40.2	876	7.4	103	0.9	325	2.8
計	116 575	62 357	53.5	552	0.5	41 588	35.7	8 986	7.7	1 537	1.3	1 555	1.3

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	10 003	8 082	80.8	194	1.9	1 556	15.6	133	1.3	33	0.3	5	0.0
30 ～ 39	13 039	10 262	78.7	92	0.7	2 335	17.9	295	2.3	46	0.4	9	0.1
40 ～ 49	14 428	9 584	66.4	37	0.3	4 091	28.4	581	4.0	68	0.5	67	0.5
50 ～ 59	15 799	6 968	44.1	8	0.1	6 599	41.8	1 625	10.3	247	1.6	352	2.2
60 歳 ～	5 756	2 273	39.5	1	0.0	2 408	41.8	649	11.3	69	1.2	356	6.2
計	59 025	37 169	63.0	332	0.6	16 989	28.8	3 283	5.6	463	0.8	789	1.3

※総コレステロール，HDLコレステロール，トリグリセライドについて検査した者を対象とする

表8 選別聴力検査結果
男

区 分		総 数		年 齢									
				～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数		97 954	100.0	10 310	100.0	23 071	100.0	26 511	100.0	26 961	100.0	11 101	100.0
所 見 あ り 総 数		16 358	16.7	217	2.1	878	3.8	2 531	9.5	7 293	27.1	5 439	49.0
	1 K H z の み	1 692	1.7	78	0.8	190	0.8	374	1.4	661	2.5	389	3.5
	4 K H z の み	10 722	10.9	69	0.7	498	2.2	1 665	6.3	5 119	19.0	3 371	30.4
	1, 4 K H z と も	3 944	4.0	70	0.7	190	0.8	492	1.9	1 513	5.6	1 679	15.1
所 見 な し		81 596	83.3	10 093	97.9	22 193	96.2	23 980	90.5	19 668	72.9	5 662	51.0

女

区 分		総 数		年 齢									
				～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数		50 879	100.0	7 195	100.0	10 426	100.0	13 777	100.0	14 867	100.0	4 614	100.0
所 見 あ り 総 数		3 121	6.1	87	1.2	180	1.7	497	3.6	1 294	8.7	1 063	23.0
	1 K H z の み	1 062	2.1	36	0.5	74	0.7	204	1.5	449	3.0	299	6.5
	4 K H z の み	961	1.9	21	0.3	50	0.5	139	1.0	398	2.7	353	7.7
	1, 4 K H z と も	1 098	2.2	30	0.4	56	0.5	154	1.1	447	3.0	411	8.9
所 見 な し		47 758	93.9	7 108	98.8	10 246	98.3	13 280	96.4	13 573	91.3	3 551	77.0

表9 心電図検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	12 497	9 581	76.7	2 066	16.5	819	6.6	2	0.0	16	0.1	13	0.1
30 ～ 39	25 218	20 266	80.4	3 914	15.5	915	3.6	16	0.1	56	0.2	51	0.2
40 ～ 49	27 171	21 329	78.5	3 892	14.3	1 628	6.0	87	0.3	114	0.4	121	0.4
50 ～ 59	27 651	19 570	70.8	4 141	15.0	3 066	11.1	171	0.6	251	0.9	452	1.6
60 歳 ～	12 183	7 184	59.0	2 285	18.8	1 956	16.1	75	0.6	195	1.6	488	4.0
計	104 720	77 930	74.4	16 298	15.6	8 384	8.0	351	0.3	632	0.6	1 125	1.1

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	7 682	6 449	83.9	948	12.3	278	3.6	—	—	1	0.0	6	0.1
30 ～ 39	10 751	9 052	84.2	1 381	12.8	287	2.7	13	0.1	4	0.0	14	0.1
40 ～ 49	15 139	12 742	84.2	1 769	11.7	549	3.6	28	0.2	29	0.2	22	0.1
50 ～ 59	16 542	12 926	78.1	2 339	14.1	1 109	6.7	36	0.2	45	0.3	87	0.5
60 歳 ～	5 897	3 937	66.8	1 166	19.8	645	10.9	16	0.3	33	0.6	100	1.7
計	56 011	45 106	80.5	7 603	13.6	2 868	5.1	93	0.2	112	0.2	229	0.4

表10 眼底検査結果

男

女

区 分	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV
～29歳	353	348	5	—	—	—	—	—	—	375	374	1	—	—	—	—	—	—
30～39	3 815	3 645	161	—	7	—	2	—	—	1 920	1 885	33	—	2	—	—	—	—
40～49	9 428	7 742	1 617	—	49	7	13	—	—	4 694	4 170	518	—	3	1	2	—	—
50～59	9 713	5 019	4 442	—	211	12	29	—	—	5 226	3 254	1 889	—	66	3	14	—	—
60歳～	3 694	1 178	2 261	—	204	17	34	—	—	2 115	768	1 260	—	73	5	9	—	—
計	27 003	17 932	8 486	—	471	36	78	—	—	14 330	10 451	3 701	—	144	9	25	—	—

表11 糖代謝検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 421	16 179	98.5	81	0.5	62	0.4	71	0.4	22	0.1	6	0.0
30 ～ 39	33 160	32 012	96.5	210	0.6	310	0.9	308	0.9	205	0.6	115	0.3
40 ～ 49	26 742	24 416	91.3	184	0.7	611	2.3	661	2.5	494	1.8	376	1.4
50 ～ 59	27 025	22 108	81.8	269	1.0	1 180	4.4	1 459	5.4	1 013	3.7	996	3.7
60 歳 ～	11 719	9 069	77.4	123	1.0	457	3.9	849	7.2	490	4.2	731	6.2
計	115 067	103 784	90.2	867	0.8	2 620	2.3	3 348	2.9	2 224	1.9	2 224	1.9

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	9 641	9 545	99.0	24	0.2	34	0.4	29	0.3	4	0.0	5	0.1
30 ～ 39	12 729	12 497	98.2	45	0.4	57	0.4	73	0.6	31	0.2	26	0.2
40 ～ 49	14 111	13 651	96.7	41	0.3	119	0.8	163	1.2	79	0.6	58	0.4
50 ～ 59	15 493	14 377	92.8	35	0.2	348	2.2	388	2.5	168	1.1	177	1.1
60 歳 ～	5 732	5 071	88.5	16	0.3	202	3.5	203	3.5	99	1.7	141	2.5
計	57 706	55 141	95.6	161	0.3	760	1.3	856	1.5	381	0.7	407	0.7

<参考>

労働安全衛生規則第52条（様式第6号）報告する際の「有所見」の数え方

1	聴力検査（オーディオメータ）	左右の1000Hz、4000Hzのいずれかで、規定レベルの音を聴取できず「有所見」となった者
2	聴力検査（その他の方法）	会話聴力で異常の認められた者、及び補聴器使用中の者
3	胸部エックス線検査	「異常なし」と判定された以外の者（肺、胸膜の治癒所見を含む）
4	喀痰検査	「異常なし」と判定された以外の者
5	血圧検査	（1）収縮期血圧 140mmHg以上の者 （2）拡張期血圧 90mmHg以上の者
6	貧血検査	血色素量が男で12.9g/dℓ以下、女で11.4g/dℓ以下の者
7	肝機能検査	（1）GOT 34IU/ℓ以上 （2）GPT 31IU/ℓ以上 （3） γ -GTP 75IU/ℓ以上の者
8	血中脂質検査	（1）総コレステロール 130～219mg/dℓ以外の者 （2）HDLコレステロール 39mg/dℓ以下の者 （3）トリグリセライド 150mg/dℓ以上の者
9	血糖検査	（1）空腹時血糖 110mg/dℓ以上の者 （2）随時血糖 140mg/dℓ以上の者 （3）HbA1C 5.9%以上の者
10	尿検査（糖）	+以上の者。（±は除く）
11	尿検査（蛋白）	+以上の者。（±は除く）
12	心電図検査	判定において「異常なし」「心配なし」以外の者
13	所見のあった者の人数	上記1～12の各項において、「有所見」となった者の実人数
14	医師の指示人数	総合判定において、「要二次検査（要精検・再検）」「要受診」「受診中」とされた者

表12-1 年齢階層別有所見者数及び有所見率(男性)

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		2 546	30 199	53 501	36 243	35 726	13 452	1 086	172 753
有所見者数		566	8 876	25 128	21 964	24 145	9 672	827	91 178
有所見率		22.2%	29.4%	47.0%	60.6%	67.6%	71.9%	76.2%	52.8%
医師の指示人数		93	2 523	8 796	9 442	12 125	5 644	522	39 145
指示率		3.7%	8.4%	16.4%	26.1%	33.9%	42.0%	48.1%	22.7%
聴力 (1000Hz)	実施者数	314	10 029	23 327	27 188	27 552	10 650	667	99 727
	有所見者数	－	87	222	553	1 462	1 250	183	3 757
	有所見率	－	0.9%	1.0%	2.0%	5.3%	11.7%	27.4%	3.8%
聴力 (4000Hz)	実施者数	314	10 029	23 327	27 188	27 552	10 650	667	99 727
	有所見者数	2	84	426	1 504	4 897	3 494	372	10 779
	有所見率	0.6%	0.8%	1.8%	5.5%	17.8%	32.8%	55.8%	10.8%
聴力その他	実施者数	478	16 632	26 649	4 763	3 978	1 450	61	54 011
	有所見者数	－	30	64	12	5	5	3	119
	有所見率	－	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.3%	4.9%	0.2%
胸部X線	実施者数	2 416	26 329	42 990	26 722	26 896	11 214	960	137 527
	有所見者数	31	803	2 650	2 782	4 542	2 976	416	14 200
	有所見率	1.3%	3.0%	6.2%	10.4%	16.9%	26.5%	43.3%	10.3%
血圧	実施者数	2 436	29 121	50 627	32 323	32 082	12 737	973	160 299
	有所見者数	41	1 107	3 824	5 248	8 828	4 186	356	23 590
	有所見率	1.7%	3.8%	7.6%	16.2%	27.5%	32.9%	36.6%	14.7%
貧血	実施者数	390	17 914	38 937	28 861	28 779	11 305	934	127 120
	有所見者数	2	62	213	318	782	488	83	1 948
	有所見率	0.5%	0.3%	0.5%	1.1%	2.7%	4.3%	8.9%	1.5%
肝機能	実施者数	332	17 746	38 639	28 536	28 502	11 387	959	126 101
	有所見者数	50	3 693	12 901	11 150	10 170	3 509	221	41 694
	有所見率	15.1%	20.8%	33.4%	39.1%	35.7%	30.8%	23.0%	33.1%
血中脂質	実施者数	331	17 302	37 619	28 100	28 235	11 343	921	123 851
	有所見者数	67	4 578	15 270	14 613	15 019	5 723	452	55 722
	有所見率	20.2%	26.5%	40.6%	52.0%	53.2%	50.5%	49.1%	45.0%
血糖	実施者数	326	16 380	34 248	27 781	27 744	10 934	911	118 324
	有所見者数	2	178	977	2 292	4 943	2 330	175	10 897
	有所見率	0.6%	1.1%	2.9%	8.3%	17.8%	21.3%	19.2%	9.2%
尿糖	実施者数	2 490	29 471	50 575	32 211	31 860	12 662	1 001	160 270
	有所見者数	16	212	787	1 042	1 974	972	83	5 086
	有所見率	0.6%	0.7%	1.6%	3.2%	6.2%	7.7%	8.3%	3.2%
尿蛋白	実施者数	2 490	29 498	50 623	32 217	31 867	12 664	1 001	160 360
	有所見者数	49	517	997	976	1 538	781	66	4 924
	有所見率	2.0%	1.8%	2.0%	3.0%	4.8%	6.2%	6.6%	3.1%
心電図	実施者数	1 493	11 016	25 282	27 740	27 791	11 293	916	105 531
	有所見者数	359	496	1 055	2 039	4 048	2 480	266	10 743
	有所見率	24.0%	4.5%	4.2%	7.4%	14.6%	22.0%	29.0%	10.2%

表12-2 年齢階層別有所見者数及び有所見率(女性)

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		1 930	20 094	22 829	19 139	20 028	6 939	940	91 899
有所見者数		265	3 342	6 006	8 387	12 454	4 416	424	35 294
有所見率		13.7%	16.6%	26.3%	43.8%	62.2%	63.6%	45.1%	38.4%
医師の指示人数		108	1 212	1 986	3 172	4 826	2 101	218	13 623
指示率		5.6%	6.0%	8.7%	16.6%	24.1%	30.3%	23.2%	14.8%
聴力 (1000Hz)	実施者数	151	7 144	10 767	14 326	15 400	4 534	185	52 507
	有所見者数	1	38	89	245	603	470	46	1 492
	有所見率	0.7%	0.5%	0.8%	1.7%	3.9%	10.4%	24.9%	2.8%
聴力 (4000Hz)	実施者数	151	7 144	10 767	14 326	15 400	4 534	185	52 507
	有所見者数	1	26	80	193	524	444	50	1 318
	有所見率	0.7%	0.4%	0.7%	1.3%	3.4%	9.8%	27.0%	2.5%
聴力その他	実施者数	699	10 555	9 317	1 444	979	250	15	23 259
	有所見者数	－	11	22	1	1	－	－	35
	有所見率	－	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	－	－	0.2%
胸部X線	実施者数	1 783	17 310	17 949	14 952	16 080	5 424	531	74 029
	有所見者数	25	274	639	1 073	2 082	1 066	177	5 336
	有所見率	1.4%	1.6%	3.6%	7.2%	12.9%	19.7%	33.3%	7.2%
血圧	実施者数	1 841	18 840	20 898	16 725	17 551	5 683	469	82 007
	有所見者数	11	96	365	1 128	2 673	1 162	100	5 535
	有所見率	0.6%	0.5%	1.7%	6.7%	15.2%	20.4%	21.3%	6.7%
貧血	実施者数	700	12 972	17 704	15 973	16 763	5 476	478	70 066
	有所見者数	27	706	1 571	2 287	773	109	20	5 493
	有所見率	3.9%	5.4%	8.9%	14.3%	4.6%	2.0%	4.2%	7.8%
肝機能	実施者数	149	11 498	17 092	15 661	16 827	5 498	475	67 200
	有所見者数	4	303	726	961	2 037	702	56	4 789
	有所見率	2.7%	2.6%	4.2%	6.1%	12.1%	12.8%	11.8%	7.1%
血中脂質	実施者数	150	11 229	16 856	15 575	16 781	5 487	451	66 529
	有所見者数	23	1 368	2 854	4 483	9 343	3 340	270	21 681
	有所見率	15.3%	12.2%	16.9%	28.8%	55.7%	60.9%	59.9%	32.6%
血糖	実施者数	145	10 308	13 794	15 096	16 133	5 303	469	61 248
	有所見者数	2	100	211	474	1 144	557	70	2 558
	有所見率	1.4%	1.0%	1.5%	3.1%	7.1%	10.5%	14.9%	4.2%
尿糖	実施者数	1 813	18 986	20 566	16 446	17 563	5 678	482	81 534
	有所見者数	13	71	163	146	223	100	5	721
	有所見率	0.7%	0.4%	0.8%	0.9%	1.3%	1.8%	1.0%	0.9%
尿蛋白	実施者数	1 813	19 018	20 587	16 461	17 569	5 678	482	81 608
	有所見者数	69	586	414	320	322	123	14	1 848
	有所見率	3.8%	3.1%	2.0%	1.9%	1.8%	2.2%	2.9%	2.3%
心電図	実施者数	745	6 956	10 816	15 398	16 655	5 452	450	56 472
	有所見者数	105	187	324	655	1 316	716	91	3 394
	有所見率	14.1%	2.7%	3.0%	4.3%	7.9%	13.1%	20.2%	6.0%