

一 般 健 康 診 断

表 1 一般健康診断等の種類別受診者及び受診団体数

1-1 一般健康診断

区 分	総 数		一 般 健 康 診 断					一般健康診断時に行うその他の健診		
	受診者	受診団体	全項目等 ¹⁾	省略項目等 ²⁾	その他	雇入れ時	計	総合健診 ³⁾	婦人健診 ⁴⁾	その他の ⁵⁾ 検診・検査
17年度	280 276	2 363	93 999	62 638	54 235	9 062	219 934	40 296	576	19 470
16年度	265 103	2 240	84 066	62 956	48 007	7 501	202 530	41 864	761	19 948
15年度	251 091	2 349	77 846	55 295	51 578	4 933	189 652	42 132	843	18 464

※受診者は延数、受診団体は実数（代表団体）

1) 全項目とは労働安全衛生規則で定められた35歳及び40歳以上の者の健診及び項目を追加して実施した健診

2) 省略項目とは労働安全衛生規則で認められた一部項目を省略して行った健診及び項目を追加して実施した健診

3) 総合健診とは一般健診に消化器検診を加えて行った健診

4) 婦人健診とは女性を対象とした協会のセット健診(子宮がん、乳がん、循環器、貧血など20項目)但し、子宮がん、乳がん検診結果については別掲

5) その他の検診・検査とは健康診断項目の一部を受託して実施した検診検査

1-2 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診

区分	総 数		一 般 健 診	日 帰 り 人間ドック	乳がん・ 子宮がん検診	付 加 健 診	フォローアップ 健 診
	受診者数	受診団体					
17年度	19 303	2 091	18 789	—	514	301	138
16年度	17 702	1 863	17 258	—	444	287	139
15年度	16 263	1 510	15 980	—	283	181	137

表 2 胸部X線検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		年 1 回観察		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	31 289	30 246	96.7	813	2.6	50	0.2	165	0.5	9	0.0	6	0.0
30 ～ 39	43 275	40 501	93.6	2 200	5.1	331	0.8	223	0.5	12	0.0	8	0.0
40 ～ 49	27 061	24 465	90.4	1 871	6.9	516	1.9	186	0.7	16	0.1	7	0.0
50 ～ 59	26 228	21 956	83.7	2 713	10.3	1 208	4.6	312	1.2	26	0.1	13	0.0
60 歳 ～	12 069	9 314	77.2	1 963	16.3	504	4.2	268	2.2	11	0.1	9	0.1
計	139 922	126 482	90.4	9 560	6.8	2 609	1.9	1 154	0.8	74	0.1	43	0.0

女

区 分	受診者	異常なし		年 1 回観察		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	20 101	19 776	98.4	230	1.1	24	0.1	65	0.3	4	0.0	2	0.0
30 ～ 39	18 448	17 751	96.2	471	2.6	154	0.8	65	0.4	3	0.0	4	0.0
40 ～ 49	15 169	14 153	93.3	612	4.0	313	2.1	83	0.5	7	0.0	1	0.0
50 ～ 59	15 478	13 528	87.4	1 192	7.7	573	3.7	170	1.1	7	0.0	8	0.1
60 歳 ～	5 154	4 208	81.6	709	13.8	128	2.5	103	2.0	—	—	6	0.1
計	74 350	69 416	93.4	3 214	4.3	1 192	1.6	486	0.7	21	0.0	21	0.0

※心臓、大動脈等の異常で呼吸器系として問題のない所見は除く

表3 血圧検査結果
男

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	32 991	118.4	12.4	69.9	9.2	31 676	96.0	1 065	3.2	250	0.8
30～39	51 085	120.2	13.1	74.2	10.1	46 879	91.8	3 005	5.9	1 201	2.4
40～49	33 319	123.1	14.6	78.6	10.9	27 790	83.4	3 600	10.8	1 929	5.8
50～59	31 962	129.3	17.0	81.7	10.9	22 855	71.5	5 975	18.7	3 132	9.8
60歳～	14 078	133.9	17.2	81.3	10.4	9 127	64.8	3 413	24.2	1 538	10.9
計	163 435	123.4	15.3	76.3	11.1	138 327	84.6	17 058	10.4	8 050	4.9

女

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	21 363	108.1	11.2	64.3	8.2	21 216	99.3	119	0.6	28	0.1
30～39	21 538	109.8	12.2	66.9	9.0	21 130	98.1	296	1.4	112	0.5
40～49	17 447	115.4	15.3	71.5	10.5	16 188	92.8	860	4.9	399	2.3
50～59	17 863	122.3	17.4	75.6	11.0	15 064	84.3	1 927	10.8	872	4.9
60歳～	6 318	126.9	17.7	76.2	10.5	4 999	79.1	967	15.3	352	5.6
計	84 529	114.4	15.7	69.7	10.7	78 597	93.0	4 169	4.9	1 763	2.1

表4 肥満度
男

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～-21		-20～-11		-10～10		11～20		21～30		31～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	32 947	2.6	15.1	655	2.0	4 473	13.6	20 465	62.1	3 876	11.8	1 800	5.5	1 678	5.1
30～39	50 833	7.2	15.7	516	1.0	4 221	8.3	28 618	56.3	8 998	17.7	4 541	8.9	3 939	7.7
40～49	33 119	8.9	14.7	260	0.8	1 999	6.0	17 466	52.7	7 209	21.8	3 642	11.0	2 543	7.7
50～59	31 759	7.7	13.1	275	0.9	1 809	5.7	17 616	55.5	7 281	22.9	3 199	10.1	1 579	5.0
60歳～	13 956	6.8	12.3	137	1.0	834	6.0	7 994	57.3	3 278	23.5	1 233	8.8	480	3.4
計	162 614	6.7	14.8	1 843	1.1	13 336	8.2	92 159	56.7	30 642	18.8	14 415	8.9	10 219	6.3

女

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～-21		-20～-11		-10～10		11～20		21～30		31～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	21 291	-5.5	13.2	1 426	6.7	6 793	31.9	11 142	52.3	1 064	5.0	400	1.9	466	2.2
30～39	21 152	-3.6	15.1	1 230	5.8	6 393	30.2	10 700	50.6	1 342	6.3	671	3.2	816	3.9
40～49	16 968	0.2	15.5	529	3.1	3 512	20.7	9 635	56.8	1 654	9.7	805	4.7	833	4.9
50～59	17 765	2.5	14.7	428	2.4	2 597	14.6	10 425	58.7	2 368	13.3	1 110	6.2	837	4.7
60歳～	6 262	3.7	14.0	134	2.1	731	11.7	3 681	58.8	994	15.9	457	7.3	265	4.2
計	83 438	-1.5	15.0	3 747	4.5	20 026	24.0	45 583	54.6	7 422	8.9	3 443	4.1	3 217	3.9

※肥満度：BMI (Body Mass Index) が22となる場合を標準として算出した
標準体重身長(m)²×2

$$\text{肥満度} = \frac{\text{体重実測値} - \text{標準体重}}{\text{標準体重}} (\%)$$

表5 貧血検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	19 131	18 619	97.3	82	0.4	387	2.0	27	0.1	13	0.1	3	0.0
30 ～ 39	37 155	36 073	97.1	97	0.3	874	2.4	44	0.1	55	0.1	12	0.0
40 ～ 49	27 920	26 801	96.0	28	0.1	932	3.3	89	0.3	60	0.2	10	0.0
50 ～ 59	27 334	25 685	94.0	16	0.1	1 347	4.9	180	0.7	90	0.3	16	0.1
60 歳 ～	12 313	11 442	92.9	1	0.0	672	5.5	124	1.0	55	0.4	19	0.2
計	123 853	118 620	95.8	224	0.2	4 212	3.4	464	0.4	273	0.2	60	0.0

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	11 732	10 958	93.4	46	0.4	419	3.6	162	1.4	115	1.0	32	0.3
30 ～ 39	16 464	14 648	89.0	33	0.2	1 019	6.2	402	2.4	290	1.8	72	0.4
40 ～ 49	15 449	12 776	82.7	21	0.1	1 318	8.5	597	3.9	557	3.6	180	1.2
50 ～ 59	16 387	15 155	92.5	13	0.1	805	4.9	196	1.2	156	1.0	62	0.4
60 歳 ～	6 048	5 809	96.0	0	0.0	191	3.2	33	0.5	8	0.1	7	0.1
計	66 080	59 346	89.8	113	0.2	3 752	5.7	1 390	2.1	1 126	1.7	353	0.5

※血色素量・赤血球数を実施している者を対象とする

表6 肝機能検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	19 175	14 913	77.8	85	0.4	2 682	14.0	1 412	7.4	68	0.4	15	0.1
30 ～ 39	37 901	25 013	66.0	308	0.8	7 830	20.7	4 457	11.8	226	0.6	67	0.2
40 ～ 49	28 485	16 427	57.7	123	0.4	7 624	26.8	3 939	13.8	238	0.8	134	0.5
50 ～ 59	28 001	16 472	58.8	44	0.2	7 750	27.7	3 288	11.7	246	0.9	201	0.7
60 歳 ～	12 605	8 231	65.3	2	0.0	2 964	23.5	1 200	9.5	77	0.6	131	1.0
計	126 167	81 056	64.2	562	0.4	28 850	22.9	14 296	11.3	855	0.7	548	0.4

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	12 025	11 602	96.5	11	0.1	319	2.7	86	0.7	6	0.0	1	0.0
30 ～ 39	17 159	16 002	93.3	6	0.0	898	5.2	232	1.4	15	0.1	6	0.0
40 ～ 49	16 020	14 427	90.1	6	0.0	1 261	7.9	293	1.8	18	0.1	15	0.1
50 ～ 59	16 983	13 946	82.1	4	0.0	2 419	14.2	537	3.2	32	0.2	45	0.3
60 歳 ～	6 127	5 078	82.9	1	0.0	816	13.3	199	3.2	3	0.0	30	0.5
計	68 314	61 055	89.4	28	0.0	5 713	8.4	1 347	2.0	74	0.1	97	0.1

※GOT、GPT、 γ -GTPについて検査した者を対象とする

表7 脂質検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	18 680	13 453	72.0	272	1.5	4 316	23.1	545	2.9	82	0.4	12	0.1
30 ～ 39	34 809	20 396	58.6	426	1.2	10 974	31.5	2 401	6.9	464	1.3	148	0.4
40 ～ 49	27 883	13 057	46.8	156	0.6	10 837	38.9	2 951	10.6	580	2.1	302	1.1
50 ～ 59	27 341	12 656	46.3	117	0.4	11 040	40.4	2 629	9.6	488	1.8	411	1.5
60 歳 ～	12 197	6 127	50.2	7	0.1	4 824	39.6	862	7.1	121	1.0	256	2.1
計	120 910	65 689	54.3	978	0.8	41 991	34.7	9 388	7.8	1 735	1.4	1 129	0.9

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	11 256	9 119	81.0	374	3.3	1 611	14.3	122	1.1	30	0.3	0	0.0
30 ～ 39	13 997	11 070	79.1	138	1.0	2 446	17.5	274	2.0	52	0.4	17	0.1
40 ～ 49	15 287	10 172	66.5	99	0.6	4 301	28.1	590	3.9	82	0.5	43	0.3
50 ～ 59	16 221	7 230	44.6	57	0.4	6 667	41.1	1 692	10.4	263	1.6	312	1.9
60 歳 ～	5 970	2 400	40.2	3	0.1	2 500	41.9	720	12.1	73	1.2	274	4.6
計	62 731	39 991	63.7	671	1.1	17 525	27.9	3 398	5.4	500	0.8	646	1.0

※総コレステロール，HDLコレステロール，トリグリセライドについて検査した者を対象とする

表8 選別聴力検査結果
男

区 分		総 数		年 齢									
				～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数		101 270	100.0	12 241	100.0	23 915	100.0	26 918	100.0	26 798	100.0	11 398	100.0
所 見 あ り 総 数		15 624	15.4	211	1.7	846	3.5	2 321	8.6	6 826	25.5	5 420	47.6
	1 K H z の み	1 509	1.5	62	0.5	165	0.7	304	1.1	608	2.3	370	3.2
	4 K H z の み	10 404	10.3	60	0.5	493	2.1	1 562	5.8	4 883	18.2	3 406	29.9
	1 , 4 K H z と も	3 711	3.7	89	0.7	188	0.8	455	1.7	1 335	5.0	1 644	14.4
所 見 な し		85 646	84.6	12 030	98.3	23 069	96.5	24 597	91.4	19 972	74.5	5 978	52.4

女

区 分		総 数		年 齢									
				～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数		53 434	100.0	8 067	100.0	11 075	100.0	14 419	100.0	15 166	100.0	4 707	100.0
所 見 あ り 総 数		2 915	5.5	84	1.0	187	1.7	453	3.1	1 216	8.0	975	20.7
	1 K H z の み	939	1.8	27	0.3	67	0.6	163	1.1	425	2.8	257	5.5
	4 K H z の み	890	1.7	19	0.2	51	0.5	135	0.9	357	2.4	328	7.0
	1 , 4 K H z と も	1 086	2.0	38	0.5	69	0.6	155	1.1	434	2.9	390	8.3
所 見 な し		50 519	94.5	7 983	99.0	10 888	98.3	13 966	96.9	13 950	92.0	3 732	79.3

表9 心電図検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	15 640	11 859	75.8	2 697	17.2	1 048	6.7	5	0.0	14	0.1	17	0.1
30 ～ 39	27 366	22 228	81.2	4 078	14.9	955	3.5	25	0.1	49	0.2	31	0.1
40 ～ 49	28 578	22 397	78.4	4 057	14.2	1 825	6.4	82	0.3	106	0.4	111	0.4
50 ～ 59	27 888	19 778	70.9	4 088	14.7	3 230	11.6	204	0.7	215	0.8	373	1.3
60 歳 ～	12 548	7 284	58.0	2 304	18.4	2 226	17.7	88	0.7	206	1.6	440	3.5
計	112 020	83 546	74.6	17 224	15.4	9 284	8.3	404	0.4	590	0.5	972	0.9

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	8 625	7 165	83.1	1 070	12.4	374	4.3	6	0.1	4	0.0	6	0.1
30 ～ 39	11 891	9 948	83.7	1 546	13.0	356	3.0	19	0.2	12	0.1	10	0.1
40 ～ 49	15 964	13 389	83.9	1 820	11.4	666	4.2	50	0.3	18	0.1	21	0.1
50 ～ 59	16 875	13 147	77.9	2 315	13.7	1 269	7.5	46	0.3	44	0.3	54	0.3
60 歳 ～	6 100	4 077	66.8	1 159	19.0	733	12.0	16	0.3	37	0.6	78	1.3
計	59 455	47 726	80.3	7 910	13.3	3 398	5.7	137	0.2	115	0.2	169	0.3

表10 眼底検査結果

男

女

区 分	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV
～29歳	343	337	6	—	—	—	—	—	—	354	353	1	—	—	—	—	—	—
30～39	3 517	3 369	142	—	5	—	1	—	—	1 857	1 830	26	—	1	—	—	—	—
40～49	9 348	7 738	1 553	—	41	7	9	—	—	4 820	4 345	460	—	12	1	2	—	—
50～59	9 560	4 669	4 617	—	225	15	33	—	1	5 271	3 128	2 070	—	62	5	6	—	—
60歳～	3 778	1 144	2 321	—	272	21	20	—	—	2 262	740	1 395	—	106	9	12	—	—
計	26 546	17 257	8 639	—	543	43	63	—	1	14 564	10 396	3 952	—	181	15	20	—	—

表11 糖代謝検査結果

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	18 107	17 837	98.5	78	0.4	72	0.4	82	0.5	23	0.1	15	0.1
30 ～ 39	33 753	32 585	96.5	228	0.7	316	0.9	301	0.9	214	0.6	109	0.3
40 ～ 49	27 313	24 947	91.3	204	0.7	633	2.3	644	2.4	551	2.0	334	1.2
50 ～ 59	26 789	22 007	82.1	292	1.1	1 264	4.7	1 339	5.0	1 082	4.0	805	3.0
60 歳 ～	12 154	9 351	76.9	196	1.6	487	4.0	923	7.6	545	4.5	652	5.4
計	118 116	106 727	90.4	998	0.8	2 772	2.3	3 289	2.8	2 415	2.0	1 915	1.6

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	10 585	10 480	99.0	21	0.2	25	0.2	50	0.5	6	0.1	3	0.0
30 ～ 39	13 401	13 167	98.3	44	0.3	70	0.5	63	0.5	26	0.2	31	0.2
40 ～ 49	14 768	14 305	96.9	48	0.3	119	0.8	161	1.1	82	0.6	53	0.4
50 ～ 59	15 854	14 786	93.3	31	0.2	320	2.0	362	2.3	181	1.1	174	1.1
60 歳 ～	5 913	5 281	89.3	22	0.4	208	3.5	167	2.8	91	1.5	144	2.4
計	60 521	58 019	95.9	166	0.3	742	1.2	803	1.3	386	0.6	405	0.7

<参考>

労働安全衛生規則第52条（様式第6号）報告する際の「有所見」の数え方

1	聴力検査（オーディオメータ）	左右の1000Hz、4000Hzのいずれかで、規定レベルの音を聴取できず「有所見」となった者
2	聴力検査（その他の方法）	会話聴力で異常の認められた者、及び補聴器使用中の者
3	胸部エックス線検査	「異常なし」と判定された以外の者（肺、胸膜の治癒所見を含む）
4	喀痰検査	「異常なし」と判定された以外の者
5	血圧検査	（1）収縮期血圧 140mmHg以上の者 （2）拡張期血圧 90mmHg以上の者
6	貧血検査	血色素量が男で12.9g/dℓ以下、女で11.4g/dℓ以下の者
7	肝機能検査	（1）GOT 34IU/ℓ以上 （2）GPT 31IU/ℓ以上 （3）γ-GTP 75IU/ℓ以上の者
8	血中脂質検査	（1）総コレステロール 130～219mg/dℓ以外の者 （2）HDLコレステロール 39mg/dℓ以下の者 （3）トリグリセライド 150mg/dℓ以上の者
9	血糖検査	（1）空腹時血糖 110mg/dℓ以上の者 （2）随時血糖 140mg/dℓ以上の者 （3）HbA1C 5.9%以上の者
10	尿検査（糖）	+以上の者。（±は除く）
11	尿検査（蛋白）	+以上の者。（±は除く）
12	心電図検査	判定において「異常なし」「心配なし」以外の者
13	所見のあった者の人数	上記1～12の各項において、「有所見」となった者の実人数
14	医師の指示人数	総合判定において、「要二次検査（要精検・再検）」「要受診」「受診中」とされた者

表12-1 年齢階層別有所見者数及び有所見率(男性)

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		5 189	32 402	54 708	37 884	36 057	13 687	1 203	181 130
有所見者数		1 015	10 046	26 101	23 748	26 433	11 259	1 062	99 664
有所見率		19.6%	31.0%	47.7%	62.7%	73.3%	82.3%	88.3%	55.0%
医師の指示人数		92	2 750	8 641	9 582	12 030	5 745	582	39 422
指示率		1.8%	8.5%	15.8%	25.3%	33.4%	42.0%	48.4%	21.8%
聴力 (1000Hz)	実施者数	2 148	12 552	24 854	27 690	27 395	10 830	749	106 218
	有所見者数	11	82	209	509	1 292	1 221	181	3 505
	有所見率	0.5%	0.7%	0.8%	1.8%	4.7%	11.3%	24.2%	3.3%
聴力 (4000Hz)	実施者数	2 148	12 552	24 854	27 690	27 395	10 830	749	106 218
	有所見者数	12	90	428	1 380	4 577	3 470	412	10 369
	有所見率	0.6%	0.7%	1.7%	5.0%	16.7%	32.0%	55.0%	9.8%
聴力その他	実施者数	430	16 196	26 328	5 523	4 215	1 455	73	54 220
	有所見者数	－	32	65	23	9	6	1	136
	有所見率	－	0.2%	0.2%	0.4%	0.2%	0.4%	1.4%	0.3%
胸部X線	実施者数	3 203	28 086	43 277	27 062	26 230	11 170	900	139 928
	有所見者数	35	1 038	3 126	3 151	5 122	3 239	405	16 116
	有所見率	1.1%	3.7%	7.2%	11.6%	19.5%	29.0%	45.0%	11.5%
血圧	実施者数	5 089	31 218	51 927	33 935	32 313	12 933	1 151	168 566
	有所見者数	163	1 151	4 079	5 502	9 031	4 378	431	24 735
	有所見率	3.2%	3.7%	7.9%	16.2%	27.9%	33.9%	37.4%	14.7%
貧血	実施者数	1 307	19 817	39 897	29 760	28 840	11 567	1 068	132 256
	有所見者数	18	96	215	324	746	485	81	1 965
	有所見率	1.4%	0.5%	0.5%	1.1%	2.6%	4.2%	7.6%	1.5%
肝機能	実施者数	349	19 717	39 727	29 599	28 668	11 637	1 090	130 787
	有所見者数	50	4 214	13 408	11 804	10 327	3 627	261	43 691
	有所見率	14.3%	21.4%	33.8%	39.9%	36.0%	31.2%	23.9%	33.4%
血中脂質	実施者数	1 263	19 404	38 814	29 200	28 495	11 593	1 052	129 821
	有所見者数	213	5 027	15 632	15 106	15 093	5 715	486	57 272
	有所見率	16.9%	25.9%	40.3%	51.7%	53.0%	49.3%	46.2%	44.1%
血糖	実施者数	1 174	18 348	35 492	28 797	27 940	11 272	1 025	124 048
	有所見者数	4	178	969	2 354	4 891	2 395	216	11 007
	有所見率	0.3%	1.0%	2.7%	8.2%	17.5%	21.2%	21.1%	8.9%
尿糖	実施者数	5 105	31 672	51 719	33 557	31 969	12 850	1 152	168 024
	有所見者数	16	225	834	1 100	2 003	1 016	78	5 272
	有所見率	0.3%	0.7%	1.6%	3.3%	6.3%	7.9%	6.8%	3.1%
尿蛋白	実施者数	5 105	31 708	51 858	33 591	31 993	12 853	1 152	168 260
	有所見者数	113	510	907	874	1 393	692	69	4 558
	有所見率	2.2%	1.6%	1.7%	2.6%	4.4%	5.4%	6.0%	2.7%
心電図	実施者数	2 487	13 270	27 371	28 578	27 887	11 495	1 051	112 139
	有所見者数	478	733	1 070	2 165	4 074	2 653	327	11 500
	有所見率	19.2%	5.5%	3.9%	7.6%	14.6%	23.1%	31.1%	10.3%

表12-2 年齢階層別有所見者数及び有所見率(女性)

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		2 780	20 653	23 452	20 118	20 670	7 282	1 072	96 027
有所見者数		381	3 518	6 242	8 988	13 194	4 756	520	37 599
有所見率		13.7%	17.0%	26.6%	44.7%	63.8%	65.3%	48.5%	39.2%
医師の指示人数		140	1 172	2 049	3 302	4 971	2 039	259	13 932
指示率		5.0%	5.7%	8.7%	16.4%	24.0%	28.0%	24.2%	14.5%
聴力 (1000Hz)	実施者数	549	8 125	11 485	14 884	15 604	4 591	202	55 440
	有所見者数	2	39	77	224	586	421	60	31
	有所見率	0.4%	0.5%	0.7%	1.5%	3.8%	9.2%	29.7%	0.1%
聴力 (4000Hz)	実施者数	549	8 125	11 485	14 884	15 604	4 591	202	55 440
	有所見者数	4	30	83	197	481	429	51	1 275
	有所見率	0.7%	0.4%	0.7%	1.3%	3.1%	9.3%	25.2%	2.3%
聴力その他	実施者数	240	10 077	9 281	1 530	1 112	229	13	22 482
	有所見者数	－	7	19	3	1	－	－	30
	有所見率	－	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	－	－	0.1%
胸部X線	実施者数	2 189	17 913	18 449	15 170	15 479	4 811	343	74 354
	有所見者数	15	330	791	1 228	2 362	988	131	5 845
	有所見率	0.7%	1.8%	4.3%	8.1%	15.3%	20.5%	38.2%	7.9%
血圧	実施者数	2 645	19 424	21 675	17 464	17 877	5 749	571	85 405
	有所見者数	11	117	390	1 229	2 706	1 141	122	5 716
	有所見率	0.4%	0.6%	1.8%	7.0%	15.1%	19.8%	21.4%	6.7%
貧血	実施者数	1 215	13 537	18 277	16 638	17 037	5 579	566	72 849
	有所見者数	53	705	1 571	2 426	739	101	30	5 625
	有所見率	4.4%	5.2%	8.6%	14.6%	4.3%	1.8%	5.3%	7.7%
肝機能	実施者数	178	12 160	17 605	16 287	17 132	5 608	566	69 536
	有所見者数	11	323	782	1 039	2 129	766	64	5 114
	有所見率	6.2%	2.7%	4.4%	6.4%	12.4%	13.7%	11.3%	7.4%
血中脂質	実施者数	427	11 974	17 383	16 206	17 090	5 587	547	69 214
	有所見者数	67	1 404	2 859	4 569	9 505	3 379	296	22 079
	有所見率	15.7%	11.7%	16.4%	28.2%	55.6%	60.5%	54.1%	31.9%
血糖	実施者数	337	11 032	14 433	15 711	16 452	5 403	543	63 911
	有所見者数	2	111	186	447	1 064	514	73	2 397
	有所見率	0.6%	1.0%	1.3%	2.8%	6.5%	9.5%	13.4%	3.8%
尿糖	実施者数	2 536	19 673	21 330	17 066	17 847	5 739	571	84 762
	有所見者数	19	79	155	149	218	106	8	734
	有所見率	0.7%	0.4%	0.7%	0.9%	1.2%	1.8%	1.4%	0.9%
尿蛋白	実施者数	2 536	19 696	21 359	17 079	17 853	5 739	571	84 833
	有所見者数	98	525	393	322	282	94	18	1 732
	有所見率	3.9%	2.7%	1.8%	1.9%	1.6%	1.6%	3.2%	2.0%
心電図	実施者数	919	7 775	11 942	15 966	16 875	5 555	543	59 575
	有所見者数	135	321	399	762	1 430	757	119	3 923
	有所見率	14.7%	4.1%	3.3%	4.8%	8.5%	13.6%	21.9%	6.6%