精密総合健診(人間ドック) ---

表 1 年度別受診者数

| 区分 | 受診者 | 男 | 女 | | |
|--------|--------|-------|-------|--|--|
| 23 年 度 | 10 279 | 6 153 | 4 126 | | |
| 22 年 度 | 10 523 | 6 260 | 4 263 | | |
| 21 年 度 | 10 465 | 6 168 | 4 297 | | |

表 2 受診者前歴内訳

| | | 6年以上 | 5年連続 | 4年連続 | 3年連続 | 2年連続 | 初 回 | 総 数 | 前年未受診 | 2年以上中断 |
|---|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 甲 | 2 691 | 323 | 440 | 468 | 690 | 1 143 | C 1E2 | 239 | 159 |
| 男 | 43.7% | 5.2% | 7.2% | 7.6% | 11.2% | 18.6% | 6 153 | 3.9% | 2.6% | |
| | 女 | 1 630 | 177 | 288 | 356 | 490 | 788 | 4 196 | 256 | 141 |
| | | 39.5% | 4.3% | 7.0% | 8.6% | 11.9% | 19.1% | 4 126 | 6.2% | 3.4% |
| 1 | 合 計 | 4 321 | 500 | 728 | 824 | 1 180 | 1 931 | 10 279 | | |

⁶年以上は、連続、非連続を含む

表 3 総合判定区分内訳

| 区分 | | | 糸 | ž Ž | 合 判 | | 定 | | | |
|-----|------|------|-------|--------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| | 異常なし | 心配なし | 要観察 | 生活注意 | 治療中 〔検査正常〕 | 治療中 〔検査異常〕 | 要再検査 | 要精密検査 | 要受診 | 総数 |
| H | 11 | 29 | 463 | 1 513 | 347 | 285 | 982 | 1 195 | 1 328 | 6 153 |
| 男 | 0.2% | 0.5% | 7.5% | 24.6% | 5.6% | 4.6% | 16.0% | 19.4% | 21.6% | 100.0% |
| 女 | 20 | 56 | 742 | 1 039 | 267 | 155 | 604 | 661 | 582 | 4 126 |
| , A | 0.5% | 1.4% | 18.0% | 25.2% | 6.5% | 3.8% | 14.6% | 16.0% | 14.1% | 100.0% |
| 合 計 | 31 | 85 | 1 205 | 2 552 | 614 | 440 | 1 586 | 1 856 | 1 910 | 10 279 |

表 4 がん発見状況の推移(新規発見)

| ぶしの部件 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| がんの部位 | 10 465 | 10 523 | 10 279 | | | |
| 食道 | 1 2 | 2 0 | | | | |
| 胃 | 5 | 8 | 7 | | | |
| 大易 | 1 | 0 | 2 | | | |
| 膵 | ž 1 | 0 | 0 | | | |
| 肝 肺 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 肺 | 1 | 1 3 | | | | |
| 腎 脈 | ž O | 4 | 1 | | | |
| 乳 | 1 | 3 | 6 | | | |
| 子宮頚音 | 3 0 | 0 | 0 | | | |
| 子宮体部 | 3 1 | 0 | 0 | | | |
| 甲状態 | ŧ 0 | 0 | 0 | | | |
| 前 立 朋 | ŧ 6 | 10 | 7 | | | |
| 悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 膀胱がみ | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合 言 | 18 | 28 | 27 | | | |
| がん発見習 | 0.17% | 0.27% | 0.26% | | | |

表 5 前立腺がん検査実施状況

| 年齢階級 | ドック男性 受診者数 | | A実施 | 要精密 | | がん発見数 (集計期間; 23.8/1~ 24.7/31) | |
|--------|---------------|-------|------|-----|------|--|--|
| | | 数 | % | 数 | % | 21.17 017 | |
| 25歳以下 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | _ | 0 | |
| 25~29歳 | 13 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 30~34歳 | 67 | 3 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 35~39歳 | 607 | 58 | 9.6 | 4 | 6.9 | 0 | |
| 40~44歳 | 963 | 125 | 13.0 | 4 | 3.2 | 0 | |
| 45~49歳 | 904 | 137 | 15.2 | 5 | 3.6 | 0 | |
| 50~54歳 | 810 | 310 | 38.3 | 21 | 6.8 | 1 | |
| 55~59歳 | 870 | 327 | 37.6 | 14 | 4.3 | 0 | |
| 60~64歳 | 934 | 379 | 40.6 | 50 | 13.2 | 4 | |
| 65~69歳 | 464 | 216 | 46.6 | 21 | 9.7 | 1 | |
| 70~74歳 | 349 | 168 | 48.1 | 14 | 8.3 | 1 | |
| 75~79歳 | 120 | 56 | 46.7 | 7 | 12.5 | 0 | |
| 80~84歳 | 32 | 11 | 34.4 | 1 | 9.1 | 0 | |
| 85歳以上 | 16 | 2 | 12.5 | 0 | _ | 0 | |
| 合計 | 6 153 | 1 793 | 29.1 | 141 | 7.9 | 7 | |

表 6 主な異常所見の有所見者数

| 異常所見等 | | 男 | ij | 4 | ζ | 言 | † |
|-----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 美 一 | · | 数 | % | 数 | % | 数 | % |
| | 肥満 | 1 870 | 30.4% | 603 | 14.6% | 2 473 | 24.1% |
| 一般計測 | 視力低下 | 1 171 | 19.1% | 917 | 22.3% | 2 088 | 20.4% |
| 感 覚 器 | 聴力低下 | 264 | 4.3% | 100 | 2.4% | 364 | 3.5% |
| | 眼圧 | 40 | 0.7% | 10 | 0.2% | 50 | 0.5% |
| | 貧血 | 231 | 3.8% | 308 | 7.5% | 539 | 5.2% |
| 血液学的検査 | 多血症 | 65 | 1.1% | 24 | 0.6% | 89 | 0.9% |
| | 白血球異常 | 159 | 2.6% | 163 | 4.0% | 322 | 3.1% |
| 腎・泌尿器 | 腎機能 | 1 239 | 20.1% | 814 | 19.7% | 2 053 | 20.0% |
| 月 他 水 船 | 尿検査 | 264 | 4.3% | 251 | 6.1% | 515 | 5.0% |
| | 脂質異常症 | 2 900 | 47.1% | 1 402 | 34.0% | 4 302 | 41.9% |
| 代 謝 系 | 耐糖能異常 | 1 424 | 23.1% | 421 | 10.2% | 1 845 | 17.9% |
| | 尿酸高值 | 1 436 | 23.3% | 60 | 1.5% | 1 496 | 14.6% |
| | 高血圧 | 881 | 14.3% | 323 | 7.8% | 1 204 | 11.7% |
| 循 環 器 | 心電図異常 | 1 770 | 28.8% | 779 | 18.9% | 2 549 | 24.8% |
| | 心胸郭比・心陰影 | 1 638 | 27.3% | 976 | 24.2% | 2 614 | 26.1% |
| 呼吸器 | 胸部X線異常 | 2 562 | 42.7% | 2 182 | 54.0% | 4 744 | 47.3% |
| 时 奴 邰 | 胸部CT異常 | 128 | 2.1% | 41 | 1.0% | 169 | 1.7% |
| | 肝機能障害 | 2 478 | 40.3% | 447 | 10.8% | 2 925 | 28.5% |
| | その他の生化学検査異常 | 890 | 14.5% | 518 | 12.6% | 1 408 | 13.7% |
| 肝 胆 膵 | HBs抗原陽性 | 76 | 1.3% | 33 | 0.8% | 109 | 1.1% |
| 加 | HBs抗体陽性 | 610 | 10.2% | 461 | 11.4% | 1 071 | 10.7% |
| | HCV抗体陽性 | 27 | 0.4% | 25 | 0.6% | 52 | 0.5% |
| | アミラーゼ高値 | 544 | 8.9% | 327 | 8.0% | 871 | 8.5% |
| | 胆石症 | 338 | 5.5% | 188 | 4.6% | 526 | 5.1% |
| 腹部超音波 | 胆嚢ポリープ | 1 179 | 19.2% | 569 | 13.8% | 1 748 | 17.0% |
| 版 部 炟 日 仮 | 肝血管腫 | 139 | 2.3% | 161 | 3.9% | 300 | 2.9% |
| | その他の所見 | 3 860 | 62.7% | 2 169 | 52.6% | 6 029 | 58.7% |
| | 胃潰瘍 (瘢痕含) | 327 | 5.6% | 115 | 3.2% | 442 | 4.7% |
| | 十二指腸潰瘍 (瘢痕含) | 754 | 13.0% | 103 | 2.9% | 857 | 9.1% |
| 胃 部 X 線 | 共存潰瘍 (瘢痕含) | 6 | 0.1% | 1 | 0.0% | 7 | 0.1% |
| | 胃ポリープ | 774 | 13.4% | 938 | 26.0% | 1 712 | 18.2% |
| | その他の所見 | 752 | 13.0% | 390 | 10.8% | 1 142 | 12.1% |
| 便 検 査 | 便潜血陽性 | 320 | 5.3% | 165 | 4.1% | 485 | 4.9% |
| /型 / 利 | 子宮所見あり | 0 | _ | 226 | 8.3% | - | _ |
| 婦人科 | 乳房所見あり | 0 | _ | 131 | 4.9% | _ | _ |

表7 胸部 X線(単純及び CT)検査所見内訳

| | | | 胸 部 X | 線(単純 | i及びCT) 実 | | |
|--------------|----------|------------|-------|------------|----------|-------------|-------|
| 胸 部 X | 線 所 見 | 男 6 003 | * | 女 4 040 | * | 計 10 043 | * |
| 肺腫瘍 | | 3 | 0.0% | 040 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| 縦隔腫瘍 | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 微細所見 | | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 3 | 0.0% |
| 777,177 | 胸膜炎 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 炎 症 像 | 気管支肺炎・肺炎 | 3 | 0.0% | 3 | 0.1% | 6 | 0.1% |
| | 炎症様陰影 | 4 | 0.1% | 3 | 0.1% | 7 | 0.1% |
| 肺結核 | • | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| | 治癒所見 | 235 | 3.9% | 201 | 5.0% | 436 | 4.3% |
| | 胸膜石灰化 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 陳旧性所見 | 肺内石灰化 | 51 | 0.8% | 41 | 1.0% | 92 | 0.9% |
| | 縦隔内石灰化 | 27 | 0.4% | 16 | 0.4% | 43 | 0.4% |
| | 胸膜癒着・肥厚 | 2 337 | 38.9% | 2 053 | 50.8% | 4 390 | 43.7% |
| 肺のう胞症 | | 117 | 1.9% | 33 | 0.8% | 150 | 1.5% |
| 肺線維症 | | 77 | 1.3% | 27 | 0.7% | 104 | 1.0% |
| 肺気腫 | | 34 | 0.6% | 0 | 0.0% | 34 | 0.3% |
| 中葉・舌区症候群 | | 11 | 0.2% | 17 | 0.4% | 28 | 0.3% |
| 気管支拡張症 | - Last | 23 | 0.4% | 24 | 0.6% | 47 | 0.5% |
| | 突出 | 979 | 16.3% | 605 | 15.0% | 1 584 | 15.8% |
| | 延長 | 14 | 0.2% | 6 | 0.1% | 20 | 0.2% |
| 大 動 脈 異 常 | 蛇行 | 228 | 3.8% | 133 | 3.3% | 361 | 3.6% |
| , t = 20 mil | 拡大 | 131 | 2.2% | 21 | 0.5% | 152 | 1.5% |
| | 壁石灰化 | 672 | 11.2% | 404 | 10.0% | 1 076 | 10.7% |
| 気利 は プログル | 大動脈瘤 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| 冠動脈石灰化 | | 94 | 1.6% | 9 | 0.2% | 103 | 1.0% |
| 肋骨骨折痕 | | 51 | 0.8% | 10 | 0.2% | 61 | 0.6% |
| 乳房手術後 | | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 3 | 0.0% |
| 肺手術後 | | 25 | 0.4% | 7 | 0.2% | 32 | 0.3% |
| じん肺 | | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 石綿肺 | | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 肺がん | | 0 | 0.0% | 101 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | | 223 | 3.7% | 101 | 2.5% | 324 | 3.2% |
| 有所見者(数・率) | ******* | 3 740 | 62.3% | 2 746 | 68.0% | 6 486 | 64.6% |

^{*}はドック胸部X線(CT同時実施を含む)検査、男女各受診者に対する有所見率 所見数は延べ件数 有所見者(数・率)は実人数

表 8 安静時心電図所見内訳

| | | 安青 | 静 時 心 電 | ② 実 が | 者 | |
|-----------------|------------|-------|------------|--------------|-------------|-------|
| 心 電 図 所 見 | 男 6 153 | * | 女 4 125 | * | 計 10 278 | * |
| 期外収縮 | 155 | 2.5% | 92 | 2.2% | 247 | 2.4% |
| 頻拍性不整脈(期外収縮を除く) | 56 | 0.9% | 4 | 0.1% | 60 | 0.6% |
| 洞徐脈(洞不全を含む) | 282 | 4.6% | 129 | 3.1% | 411 | 4.0% |
| 異所性調律 | 25 | 0.4% | 26 | 0.6% | 51 | 0.5% |
| 房室伝導異常 | 99 | 1.6% | 18 | 0.4% | 117 | 1.1% |
| 脚ブロック | 657 | 10.7% | 247 | 6.0% | 904 | 8.8% |
| 早期興奮症候群 | 6 | 0.1% | 6 | 0.1% | 12 | 0.1% |
| 虚血性変化(ST-T異常) | 211 | 3.4% | 152 | 3.7% | 363 | 3.5% |
| Q異常 | 47 | 0.8% | 13 | 0.3% | 60 | 0.6% |
| 高電位差 | 416 | 6.8% | 81 | 2.0% | 497 | 4.8% |
| 心房負荷 | 4 | 0.1% | 4 | 0.1% | 8 | 0.1% |
| 軸偏位 | 203 | 3.3% | 97 | 2.4% | 300 | 2.9% |
| 早期再分極 | 166 | 2.7% | 13 | 0.3% | 179 | 1.7% |
| 移行帯のずれ | 287 | 4.7% | 207 | 5.0% | 494 | 4.8% |
| その他 | 55 | 0.9% | 35 | 0.8% | 90 | 0.9% |
| 有所見者(数・率) | 2 111 | 34.3% | 990 | 24.0% | 3 101 | 30.2% |

^{*}はドック心電図検査、男女各受診者に対する有所見率 所見数は延べ件数 有所見者(数・率)は実人数

表 9 腹部超音波臓器別所見内訳

| | | 腹部超音波寒施者 | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|
| 対 象 臓 器 | 男 | * | 女 | * | 計 | * | | | | |
| | 6 144 | ~ | 4 116 | • | 10 260 | ^ | | | | |
| 胆のう | 1 836 | 29.9% | 910 | 22.1% | 2 746 | 26.8% | | | | |
| 肝臓 | 3 652 | 59.4% | 1 647 | 40.0% | 5 299 | 51.6% | | | | |
| 腎臓 | 2 428 | 39.5% | 1 233 | 30.0% | 3 661 | 35.7% | | | | |
| 膵臓 | 1 580 | 25.7% | 298 | 7.2% | 1 878 | 18.3% | | | | |
| 脾臓 | 419 | 6.8% | 315 | 7.7% | 734 | 7.2% | | | | |
| 大動脈 | 1 583 | 25.8% | 629 | 15.3% | 2 212 | 21.6% | | | | |
| その他 | 7 | 0.1% | 3 | 0.1% | 10 | 0.1% | | | | |
| 有所見者(数・率) | 5 394 | 87.8% | 2 986 | 72.5% | 8 380 | 81.7% | | | | |

^{*}は腹部超音波検査、男女各受診者に対する有所見率 所見数は延べ件数 有所見者(数・率)は実人数

表10 計測・検査データ平均値

| 男 | | | | | | | | | | 女 | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 計測・検査項目 | 合計 | 29歳 以下 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 | 合計 | 29歳 以下 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
| | | 6 153 | 17 | 674 | 1 867 | 1 680 | 1 398 | 469 | 48 | 4 126 | 15 | 350 | 1 123 | 1 344 | 992 | 278 | 24 |
| | 身長 (cm) | 169.9 | 173.2 | 172.5 | 171.9 | 169.9 | 168.2 | 164.8 | 160.7 | 156.9 | 160.6 | 159.5 | 158.9 | 157.1 | 155.1 | 152.2 | 148.4 |
| | 体重(kg) | 68.7 | 72.1 | 69.8 | 71.4 | 69.3 | 66.3 | 62.4 | 58.1 | 53.3 | 56.2 | 53.4 | 54.3 | 53.6 | 52.7 | 50.4 | 48.8 |
| | 肥満度(%) | 7.9 | 8.2 | 6.4 | 9.7 | 8.8 | 6.3 | 4.4 | 2.3 | -1.4 | -0.7 | -4.4 | -2.0 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | 0.8 |
| 計 | 体脂肪率(%) | 21.6 | 19.8 | 20.5 | 21.9 | 22.0 | 21.5 | 21.2 | 19.5 | 29.7 | 30.2 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.3 | 30.4 | 30.6 |
| | 腹囲 (cm) | 84.6 | 83.2 | 82.3 | 85.0 | 85.5 | 84.6 | 83.7 | 83.6 | 78.9 | 76.4 | 75.6 | 77.4 | 79.1 | 80.8 | 81.4 | 84.1 |
| 測 | 眼圧 (mmHg) | 11.6 | 13.5 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 11.4 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 9.3 |
| | 最大血圧 (mmHg) | 124 | 121 | 119 | 122 | 124 | 125 | 127 | 128 | 117 | 111 | 109 | 112 | 117 | 122 | 126 | 134 |
| | 最小血圧 (mmHg) | 78 | 71 | 73 | 78 | 81 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 69 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| | 心胸郭比(%) | 44.1 | 41.6 | 42.4 | 43.4 | 44.2 | 44.9 | 45.9 | 47.1 | 44.6 | 40.6 | 41.7 | 42.8 | 44.7 | 46.4 | 48.1 | 50.1 |
| | 総コレステロール(mg/dl) | 203 | 169 | 194 | 204 | 206 | 204 | 201 | 193 | 213 | 180 | 189 | 198 | 223 | 226 | 220 | 212 |
| | HDLコレステロール (mg/dl) | 57 | 51 | 55 | 56 | 58 | 58 | 60 | 59 | 71 | 77 | 69 | 71 | 73 | 70 | 69 | 71 |
| | LDLコレステロール (mg/dl) | 123 | 101 | 119 | 125 | 124 | 122 | 120 | 112 | 123 | 90 | 105 | 111 | 129 | 133 | 128 | 117 |
| | トリグリセライド(mg/dl) | 129 | 99 | 126 | 134 | 138 | 125 | 104 | 91 | 85 | 61 | 67 | 74 | 89 | 95 | 94 | 100 |
| | クレアチニン(mg/dl) | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.75 |
| 生. | eGFR | 68.96 | 86.12 | 77.26 | 72.61 | 68.06 | 64.31 | 60.68 | 51.58 | 69.25 | 88.67 | 78.90 | 73.62 | 68.01 | 64.84 | 61.19 | 56.88 |
| | 尿素窒素 (mg/dl) | 14.3 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 13.5 | 10.6 | 11.4 | 12.0 | 13.7 | 14.8 | 15.4 | 17.1 |
| | 尿酸 (mg/dℓ) | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |
| 化 | AST(GOT)(U/ℓ) | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 21 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 26 | 25 |
| | ALT(GPT)(U/ℓ) | 27 | 28 | 30 | 31 | 28 | 23 | 22 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 18 |
| 学 | γ GTP (U/ℓ) | 51 | 27 | 43 | 54 | 60 | 46 | 38 | 27 | 24 | 19 | 18 | 21 | 26 | 26 | 30 | 23 |
| | ALP (U/ℓ) | 211 | 211 | 210 | 212 | 212 | 209 | 211 | 219 | 204 | 150 | 167 | 167 | 219 | 231 | 231 | 253 |
| 検 | LDH (U/ℓ) | 171 | 157 | 165 | 170 | 170 | 172 | 181 | 194 | 177 | 149 | 154 | 162 | 180 | 189 | 200 | 201 |
| 作 | 総ビリルビン (mg/dℓ) | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| | 血清総蛋白(g/dl) | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| 查 | アルブミン (g/dl) | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| | 血清アミラーゼ(U/ℓ) | 72 | 67 | 68 | 67 | 71 | 77 | 84 | 92 | 75 | 64 | 70 | 73 | 77 | 78 | 78 | 83 |
| | 膵型アミラーゼ(U/ℓ) | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 34 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| | 空腹時血糖 (mg/dl) | 105 | 94 | 98 | 103 | 108 | 109 | 107 | 104 | 97 | 90 | 92 | 94 | 98 | 101 | 101 | 100 |
| | HbA1c (%) | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | リウマチ因子(U/mℓ) | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 |
| Ш | 白血球数 (/μℓ) | 5 634 | 4 959 | 5 754 | 5 752 | 5 651 | 5 538 | 5 277 | 5 304 | 4 980 | 5 447 | 5 256 | 5 161 | 4 793 | 4 933 | 4 919 | 5 363 |
| 液 | 赤血球数(万/μℓ) | 478 | 507 | 497 | 490 | 475 | 465 | 451 | 422 | 434 | 433 | 437 | 433 | 437 | 435 | 426 | 414 |
| 検 | 血色素量(g/dℓ) | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 12.7 |
| | ヘマトクリット値(%) | 43.9 | 45.5 | 44.6 | 44.5 | 44.0 | 43.3 | 42.3 | 39.8 | 39.4 | 39.2 | 38.7 | 38.6 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 38.8 |
| 査 | 血小板数(万/μℓ) | 22.5 | 22.3 | 23.8 | 23.6 | 22.6 | 21.2 | 19.9 | 17.5 | 23.7 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 23.6 | 22.7 | 22.1 | 21.4 |
| | 努力性肺活量 (ℓ) | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| 肺 | %肺活量(%) | 97.1 | 94.3 | 97.7 | 97.6 | 97.4 | 96.5 | 95.7 | 93.7 | 103.4 | 100.6 | 100.1 | 102.6 | 104.0 | 104.3 | 104.1 | 106.8 |
| 機 | 1 秒量 (ℓ) | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
| 能 | 1秒率(%) | 78.0 | 83.0 | 82.2 | 79.9 | 77.4 | 75.8 | 73.9 | 72.5 | 79.6 | 87.9 | 84.5 | 81.2 | 79.2 | 77.6 | 76.3 | 75.5 |
| 1,0 | % 1 秒量 (%) | 89.7 | 87.6 | 91.7 | 90.4 | 89.3 | 88.7 | 88.4 | 88.6 | 99.6 | 100.9 | 98.3 | 98.5 | 99.7 | 100.5 | 101.6 | 107.2 |