

一 般 健 康 診 断

表1 一般健康診断等の種類別受診者及び受診団体数

1-1 一般健康診断

区 分	総 数		一 般 健 康 診 断					一般健康診断時に行うその他の健診		
	受診者	受診団体	全項目等 ¹⁾	省略項目等 ²⁾	その他	雇入れ時	計	総合健診 ³⁾	婦人健診 ⁴⁾	その他の ⁵⁾ 検診・検査
29年度	280 196	2 154	89 318	54 548	64 099	4 205	212 170	55 634	345	12 047
28年度	281 826	2 160	93 984	53 069	67 732	4 037	218 822	51 073	283	11 648
27年度	285 198	2 193	90 171	53 108	69 641	5 794	218 714	54 657	216	11 611

※受診者は延数、受診団体は実数（代表団体）

1) 全項目とは労働安全衛生規則で定められた35歳及び40歳以上の者の健診及び項目を追加して実施した健診

2) 省略項目とは労働安全衛生規則で認められた一部項目を省略して行った健診及び項目を追加して実施した健診

3) 総合健診とは一般健診に消化器検診を加えて行った健診

4) 婦人健診とは女性を対象とした協会のセット健診（子宮がん、乳がん、循環器、貧血など20項目）但し、子宮がん、乳がん検診結果については別掲

5) その他の検診・検査とは健康診断項目の一部を受託して実施した検診検査

1-2 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

区 分	総 数		一 般 健 診			子宮頸がん検診 (単独)	付加健診	ステップアップ 検 査
	受診者数	受診団体	健康診断	乳がん検診 (併用)	子宮頸がん検診 (併用)			
29年度	24 572	2 429	24 033	1 223	2 060	539	608	11
28年度	27 501	2 393	26 911	1 301	2 210	583	680	7
27年度	25 563	2 338	24 983	1 824	1 905	580	689	9

表2 検査結果

2-1 血圧

男

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	36 705	118.0	12.1	66.2	9.6	35 726	97.3	887	2.4	92	0.3
30～39	41 350	118.7	12.8	71.7	10.2	39 014	94.4	1 900	4.6	436	1.1
40～49	44 260	121.7	14.4	77.3	11.6	37 839	85.5	4 804	10.9	1 617	3.7
50～59	37 491	125.0	15.1	80.6	11.2	29 200	77.9	6 465	17.2	1 826	4.9
60歳～	17 661	128.3	16.3	79.7	10.9	13 292	75.3	3 401	19.3	968	5.5
計	177 467	121.6	14.4	74.6	12.0	155 071	87.4	17 457	9.8	4 939	2.8

女

区 分	受診者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～99 (境界域)		160～ 又は100～ (高血圧)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～29歳	19 250	107.2	11.1	62.5	8.5	19 166	99.6	78	0.4	6	0.0
30～39	16 836	108.1	12.6	65.3	9.7	16 549	98.3	227	1.3	60	0.4
40～49	19 364	113.2	15.3	69.3	11.6	18 160	93.8	927	4.8	277	1.4
50～59	16 866	118.0	16.9	72.7	11.9	14 957	88.7	1 509	8.9	400	2.4
60歳～	8 039	123.1	17.4	73.6	11.1	6 739	83.8	1 044	13.0	256	3.2
計	80 355	112.7	15.4	68.0	11.4	75 571	94.0	3 785	4.7	999	1.2

2-2 BMI

男

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～18.4		18.5～24.9		25.0～29.9		30.0～34.9		35.0～39.9		40.0～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	36 707	22.5	3.6	2 888	7.9	26 900	73.3	5 493	15.0	1 103	3.0	240	0.7	83	0.2
30～39	41 318	23.3	3.7	1 854	4.5	28 673	69.4	8 565	20.7	1 748	4.2	377	0.9	101	0.2
40～49	44 224	24.2	3.8	1 101	2.5	27 772	62.8	12 112	27.4	2 611	5.9	475	1.1	153	0.3
50～59	37 445	24.2	3.5	925	2.5	23 205	62.0	11 092	29.6	1 884	5.0	276	0.7	63	0.2
60歳～	17 630	23.8	3.1	488	2.8	11 579	65.7	4 948	28.1	553	3.1	54	0.3	8	0.0
計	177 324	23.6	3.6	7 256	4.1	118 129	66.6	42 210	23.8	7 899	4.5	1 422	0.8	408	0.2

女

区 分	受診者	平均値	標準偏差	～18.4		18.5～24.9		25.0～29.9		30.0～34.9		35.0～39.9		40.0～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	19 242	21.0	3.1	3 244	16.9	14 312	74.4	1 337	6.9	275	1.4	57	0.3	17	0.1
30～39	16 933	21.4	3.6	2 850	16.8	11 970	70.7	1 539	9.1	438	2.6	99	0.6	37	0.2
40～49	19 581	22.1	3.9	2 322	11.9	13 652	69.7	2 668	13.6	725	3.7	162	0.8	52	0.3
50～59	17 287	22.3	3.8	2 018	11.7	11 756	68.0	2 712	15.7	653	3.8	120	0.7	28	0.2
60歳～	8 214	22.4	3.5	869	10.6	5 634	68.6	1 425	17.3	252	3.1	32	0.4	2	0.0
計	81 257	21.8	3.6	11 303	13.9	57 324	70.5	9 681	11.9	2 343	2.9	470	0.6	136	0.2

2-3 腹囲

男

区 分	受診者	～74.9		75.0～79.9		80.0～84.9		85.0～89.9		90.0～94.9		95.0～99.9		100.0～	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	15 820	7 313	46.2	3 650	23.1	2 282	14.4	1 199	7.6	603	3.8	382	2.4	391	2.5
30 ～ 39	25 483	7 309	28.7	5 961	23.4	5 253	20.6	3 155	12.4	1 795	7.0	1 003	3.9	1 007	4.0
40 ～ 49	42 817	7 919	18.5	8 603	20.1	9 940	23.2	7 013	16.4	4 318	10.1	2 458	5.7	2 566	6.0
50 ～ 59	36 133	5 071	14.0	6 597	18.3	9 066	25.1	6 678	18.5	4 225	11.7	2 487	6.9	2 009	5.6
60 歳 ～	17 119	2 267	13.2	3 053	17.8	4 548	26.6	3 526	20.6	2 099	12.3	995	5.8	631	3.7
計	137 372	29 879	21.8	27 864	20.3	31 089	22.6	21 571	15.7	13 040	9.5	7 325	5.3	6 604	4.8

女

区 分	受診者	～74.9		75.0～79.9		80.0～84.9		85.0～89.9		90.0～94.9		95.0～99.9		100.0～	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	7 749	6 046	78.0	969	12.5	393	5.1	180	2.3	77	1.0	36	0.5	48	0.6
30 ～ 39	10 569	7 056	66.8	1 704	16.1	877	8.3	406	3.8	246	2.3	129	1.2	151	1.4
40 ～ 49	18 521	9 817	53.0	3 553	19.2	2 179	11.8	1 357	7.3	733	4.0	417	2.3	465	2.5
50 ～ 59	16 338	7 188	44.0	3 205	19.6	2 557	15.7	1 610	9.9	828	5.1	470	2.9	480	2.9
60 歳 ～	7 766	2 914	37.5	1 700	21.9	1 354	17.4	921	11.9	430	5.5	268	3.5	179	2.3
計	60 943	33 021	54.2	11 131	18.3	7 360	12.1	4 474	7.3	2 314	3.8	1 320	2.2	1 323	2.2

2-4 貧血

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	20 638	19 007	92.1	404	2.0	1 113	5.4	76	0.4	33	0.2	5	0.0
30 ～ 39	29 900	28 139	94.1	157	0.5	1 477	4.9	55	0.2	62	0.2	10	0.0
40 ～ 49	35 368	33 068	93.5	186	0.5	1 841	5.2	132	0.4	118	0.3	23	0.1
50 ～ 59	30 467	28 030	92.0	120	0.4	1 938	6.4	218	0.7	131	0.4	30	0.1
60 歳 ～	15 584	13 909	89.3	38	0.2	1 294	8.3	215	1.4	97	0.6	31	0.2
計	131 957	122 153	92.6	905	0.7	7 663	5.8	696	0.5	441	0.3	99	0.1

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	13 165	11 757	89.3	52	0.4	957	7.3	196	1.5	127	1.0	76	0.6
30 ～ 39	14 610	12 556	85.9	37	0.3	1 317	9.0	354	2.4	184	1.3	162	1.1
40 ～ 49	17 464	14 268	81.7	49	0.3	1 684	9.6	714	4.1	512	2.9	237	1.4
50 ～ 59	15 626	13 855	88.7	27	0.2	1 292	8.3	215	1.4	152	1.0	85	0.5
60 歳 ～	7 471	6 910	92.5	9.0	0.1	464	6.2	60	0.8	18	0.2	10	0.1
計	68 336	59 346	86.8	174	0.3	5 714	8.4	1 539	2.3	993	1.5	570	0.8

※血色素量・赤血球数を実施している者を対象とする

2-5 肝機能

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	20 091	15 879	79.0	97	0.5	2 766	13.8	1 220	6.1	117	0.6	12	0.1
30 ～ 39	30 713	21 795	71.0	122	0.4	5 932	19.3	2 556	8.3	277	0.9	31	0.1
40 ～ 49	37 145	23 900	64.3	214	0.6	8 882	23.9	3 862	10.4	179	0.5	108	0.3
50 ～ 59	32 110	20 821	64.8	155	0.5	8 017	25.0	2 805	8.7	181	0.6	131	0.4
60 歳 ～	15 866	11 004	69.4	97	0.6	3 423	21.6	1 155	7.3	88	0.6	99	0.6
計	135 925	93 399	68.7	685	0.5	29 020	21.4	11 598	8.5	842	0.6	381	0.3

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	12 679	12 161	95.9	3	0.0	403	3.2	92	0.7	19	0.1	1	0.0
30 ～ 39	14 824	13 941	94.0	11	0.1	708	4.8	131	0.9	18	0.1	15	0.1
40 ～ 49	18 158	16 501	90.9	19	0.1	1 308	7.2	285	1.6	26	0.1	19	0.1
50 ～ 59	16 176	13 536	83.7	20	0.1	2 108	13.0	431	2.7	42	0.3	39	0.2
60 歳 ～	7 764	6 575	84.7	6	0.1	917	11.8	205	2.6	20	0.3	41	0.5
計	69 601	62 714	90.1	59	0.1	5 444	7.8	1 144	1.6	125	0.2	115	0.2

※GOT、GPT、 γ -GTPについて検査した者を対象とする

2-6 脂質

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	19 340	14 261	73.7	246	1.3	4 202	21.7	476	2.5	131	0.7	24	0.1
30 ～ 39	29 788	17 831	59.9	623	2.1	9 228	31.0	1 502	5.0	434	1.5	170	0.6
40 ～ 49	36 581	17 277	47.2	1 350	3.7	13 394	36.6	2 874	7.9	714	2.0	972	2.7
50 ～ 59	31 776	14 124	44.4	1 282	4.0	11 718	36.9	2 305	7.3	564	1.8	1 783	5.6
60 歳 ～	15 670	7 611	48.6	782	5.0	5 160	32.9	856	5.5	137	0.9	1 124	7.2
計	133 155	71 104	53.4	4 283	3.2	43 702	32.8	8 013	6.0	1 980	1.5	4 073	3.1

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	12 281	10 315	84.0	284	2.3	1 546	12.6	90	0.7	25	0.2	21	0.2
30 ～ 39	14 506	11 361	78.3	501	3.5	2 307	15.9	212	1.5	51	0.4	74	0.5
40 ～ 49	17 850	12 447	69.7	1 127	6.3	3 464	19.4	549	3.1	120	0.7	143	0.8
50 ～ 59	15 949	7 873	49.4	1 462	9.2	4 706	29.5	1 103	6.9	341	2.1	464	2.9
60 歳 ～	7 659	3 317	43.3	761	9.9	2 385	31.1	505	6.6	135	1.8	556	7.3
計	68 245	45 313	66.4	4 135	6.1	14 408	21.1	2 459	3.6	672	1.0	1 258	1.8

※LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドについて検査した者を対象とする

2-7 選別聴力

男

区 分	総 数		年 齢									
			～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数	122 558	100.0	15 132	100.0	22 772	100.0	36 802	100.0	32 132	100.0	15 720	100.0
所 見 あり 総 数	13 177	10.8	178	1.2	443	1.9	2 234	6.1	4 403	13.7	5 919	37.7
1 KHz のみ	1 488	1.2	34	0.2	100	0.4	279	0.8	550	1.7	525	3.3
4 KHz のみ	8 257	6.7	60	0.4	205	0.9	1 451	3.9	2 961	9.2	3 580	22.8
1,4KHz とも	3 432	2.8	84	0.6	138	0.6	504	1.4	892	2.8	1 814	11.5
所 見 な し	109 381	89.2	14 954	98.8	22 329	98.1	34 568	93.9	27 729	86.3	9 801	62.3

女

区 分	総 数		年 齢									
			～29歳		30～39		40～49		50～59		60歳～	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数	58 135	100.0	7 756	100.0	9 841	100.0	17 574	100.0	15 683	100.0	7 281	100.0
所 見 あり 総 数	2 621	4.5	63	0.8	139	1.4	447	2.5	755	4.8	1 217	16.7
1 KHz のみ	980	1.7	17	0.2	41	0.4	175	1.0	307	2.0	440	6.0
4 KHz のみ	700	1.2	18	0.2	28	0.3	108	0.6	216	1.4	330	4.5
1,4KHz とも	941	1.6	28	0.4	70	0.7	164	0.9	232	1.5	447	6.1
所 見 な し	55 514	95.5	7 693	99.2	9 702	98.6	17 127	97.5	14 928	95.2	6 064	83.3

2-8 心電図

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	16 642	12 399	74.5	2 337	14.0	1 875	11.3	18	0.1	4	0.0	9	0.1
30～39	22 773	18 267	80.2	3 527	15.5	907	4.0	25	0.1	17	0.1	30	0.1
40～49	36 962	28 178	76.2	5 657	15.3	2 847	7.7	107	0.3	73	0.2	100	0.3
50～59	32 278	22 783	70.6	4 930	15.3	3 852	11.9	200	0.6	156	0.5	357	1.1
60歳～	15 832	9 184	58.0	3 078	19.4	2 723	17.2	175	1.1	169	1.1	503	3.2
計	124 487	90 811	72.9	19 529	15.7	12 204	9.8	525	0.4	419	0.3	999	0.8

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	8 170	6 634	81.2	801	9.8	724	8.9	3	0.0	2	0.0	6	0.1
30～39	9 771	8 286	84.8	1 138	11.6	326	3.3	12	0.1	—	—	9	0.1
40～49	17 744	14 677	82.7	1 916	10.8	1 087	6.1	34	0.2	10	0.1	20	0.1
50～59	15 810	12 114	76.6	1 917	12.1	1 667	10.5	47	0.3	15	0.1	50	0.3
60歳～	7 397	4 937	66.7	1 377	18.6	954	12.9	30	0.4	42	0.6	57	0.8
計	58 892	46 648	79.2	7 149	12.1	4 758	8.1	126	0.2	69	0.1	142	0.2

2-9 眼底

男

区 分	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV
～29歳	306	305	1	—	—	—	—	—	—
30～39	4 222	4 166	54	—	1	1	—	—	—
40～49	11 320	10 015	1 257	—	31	9	7	—	1
50～59	12 090	6 799	5 084	—	166	34	7	—	—
60歳～	3 931	1 273	2 490	—	128	33	7	—	—
計	31 869	22 558	8 886	—	326	77	21	—	1

女

区 分	受診者	0	I	II	II a	II b	III	III a	IV
～29歳	261	261	—	—	—	—	—	—	—
30～39	2 140	2 124	16	—	—	—	—	—	—
40～49	5 762	5 404	350	—	4	4	—	—	—
50～59	5 918	4 261	1 610	—	34	10	3	—	—
60歳～	1 697	748	892	—	45	8	4	—	—
計	15 778	12 798	2 868	—	83	22	7	—	—

2-10 糖代謝

男

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	18 309	17 537	95.8	102	0.6	572	3.1	67	0.4	13	0.1	18	0.1
30～39	28 553	26 556	93.0	195	0.7	1 370	4.8	220	0.8	86	0.3	126	0.4
40～49	36 585	30 512	83.4	539	1.5	3 641	10.0	776	2.1	378	1.0	739	2.0
50～59	31 777	22 592	71.1	410	1.3	5 491	17.3	1 261	4.0	539	1.7	1 484	4.7
60歳～	15 698	9 576	61.0	301	1.9	2 907	18.5	1 314	8.4	244	1.6	1 356	8.6
計	130 922	106 773	81.6	1 547	1.2	13 981	10.7	3 638	2.8	1 260	1.0	3 723	2.8

女

区 分	受診者	異常なし		ほぼ正常		要経過観察		要二次検査		要受診		受診中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～29歳	10 638	10 115	95.1	44	0.4	438	4.1	27	0.3	3	0.0	11	0.1
30～39	13 241	12 074	91.2	96	0.7	971	7.3	66	0.5	11	0.1	23	0.2
40～49	17 853	15 154	84.9	130	0.7	2 181	12.2	209	1.2	52	0.3	127	0.7
50～59	15 962	11 761	73.7	80	0.5	3 381	21.2	382	2.4	78	0.5	280	1.8
60歳～	7 698	5 633	73.2	30	0.4	1 324	17.2	350	4.5	69	0.9	292	3.8
計	65 392	54 737	83.7	380	0.6	8 295	12.7	1 034	1.6	213	0.3	733	1.1

2-11 胸部X線

男

区 分	受診者	異常なし		年 1 回観察		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	29 683	28 668	96.6	647	2.2	208	0.7	41	0.1	113	0.4	6	0.0
30 ～ 39	34 677	32 167	92.8	1 834	5.3	562	1.6	96	0.3	7	0.0	11	0.0
40 ～ 49	36 824	32 428	88.1	3 326	9.0	868	2.4	180	0.5	14	0.0	8	0.0
50 ～ 59	32 158	26 946	83.8	3 735	11.6	1 175	3.7	261	0.8	16	0.0	25	0.1
60 歳 ～	15 922	12 240	76.9	2 614	16.4	744	4.7	287	1.8	17	0.1	20	0.1
計	149 264	132 449	88.7	12 156	8.1	3 557	2.4	865	0.6	167	0.1	70	0.0

女

区 分	受診者	異常なし		年 1 回観察		要経過観察		要二次検査		要 受 診		受 診 中	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	17 506	17 186	98.2	171	1.0	65	0.4	27	0.2	51	0.3	6	0.0
30 ～ 39	14 724	14 044	95.4	408	2.8	226	1.5	42	0.3	2	0.0	2	0.0
40 ～ 49	18 223	16 355	89.7	1 127	6.2	633	3.5	98	0.5	7	0.0	3	0.0
50 ～ 59	16 199	13 334	82.3	1 522	9.4	1 169	7.2	161	1.0	5	0.0	8	0.0
60 歳 ～	7 901	6 037	76.4	1 374	17.4	350	4.4	128	1.6	3	0.0	9	0.1
計	74 553	66 956	89.8	4 602	6.2	2 443	3.3	456	0.6	68	0.1	28	0.0

※心臓、大動脈等の異常で呼吸器系として問題のない所見は除く

〈参考〉

労働安全衛生規則第52条（様式第6号）報告する際の「有所見」の数え方

1	聴力検査（オーディオメータ）	左右の1000Hz、4000Hzのいずれかで、規定レベルの音を聴取できず「所見あり」となった者
2	聴力検査（その他の方法）	会話聴力で異常の認められた者、及び補聴器使用中の者
3	胸部X線検査	「異常なし」と判定された以外の者（肺、胸膜の治癒所見を含む）
4	喀痰検査	「異常なし」と判定された以外の者
5	血圧	（1）収縮期血圧 140mmHg以上の者 （2）拡張期血圧 90mmHg以上の者
6	貧血検査	血色素量が男で12.9g/dℓ以下、女で11.4g/dℓ以下の者
7	肝機能検査	（1）GOT 34U/l以上 （2）GPT 33U/l以上 （3）γ-GTP 75U/l以上の者
8	血中脂質検査	（1）LDLコレステロール 140mg/dℓ以上の者 （2）HDLコレステロール 39mg/dℓ以下の者 （3）トリグリセライド 150mg/dℓ以上の者
9	血糖検査	（1）空腹時血糖 110mg/dℓ以上の者 （2）随時血糖 140mg/dℓ以上の者 （3）HbA1C 6.0%以上の者
10	尿検査（糖）	+以上の者。（±は除く）
11	尿検査（蛋白）	+以上の者。（±は除く）
12	心電図検査	判定において「異常なし」「心配なし」以外の者
13	所見のあった者の人数	前記1～12の各項において、「有所見」となった者の実人数
14	医師の指示人数	総合判定において、「要二次検査（要精検・再検）」「要受診」「受診中」とされた者

表 3 - 1 年齢階層別有所見者数及び有所見率（男）

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		5 869	31 011	41 710	45 371	38 409	15 998	2 042	180 410
有所見者数		1 452	9 374	19 268	30 041	29 375	13 606	1 865	104 981
有所見率		24.7%	30.2%	46.2%	66.2%	76.5%	85.0%	91.3%	58.2%
医師の指示人数		184	2 468	6 022	11 542	13 229	7 147	1 071	41 663
指示率		3.1%	8.0%	14.4%	25.4%	34.4%	44.7%	52.4%	23.1%
聴力（1000H z）	実施者数	2 533	12 599	22 772	36 802	32 134	13 933	1 787	122 560
	有所見者数	21	97	238	783	1 443	1 775	564	4 921
	有所見率	0.8%	0.8%	1.0%	2.1%	4.5%	12.7%	31.6%	4.0%
聴力（4000H z）	実施者数	2 533	12 599	22 772	36 802	32 134	13 933	1 787	122 560
	有所見者数	25	119	343	1 955	3 853	4 357	1 037	11 689
	有所見率	1.0%	0.9%	1.5%	5.3%	12.0%	31.3%	58.0%	9.5%
聴力その他	実施者数	292	14 113	16 507	6 479	4 394	1 360	135	43 280
	有所見者数	1	14	18	10	22	4	2	71
	有所見率	0.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.5%	0.3%	1.5%	0.2%
胸部X線	実施者数	3 738	25 945	34 677	36 824	32 158	14 045	1 877	149 264
	有所見者数	84	959	2 785	5 272	6 106	3 906	783	19 895
	有所見率	2.2%	3.7%	8.0%	14.3%	19.0%	27.8%	41.7%	13.3%
血压	実施者数	5 862	30 904	41 350	44 260	37 491	15 654	2 007	177 528
	有所見者数	197	843	2 336	6 421	8 291	3 876	493	22 457
	有所見率	3.4%	2.7%	5.6%	14.5%	22.1%	24.8%	24.6%	12.6%
貧血	実施者数	1 625	20 498	32 844	38 552	33 376	14 347	1 864	143 106
	有所見者数	19	99	258	615	953	899	251	3 094
	有所見率	1.2%	0.5%	0.8%	1.6%	2.9%	6.3%	13.5%	2.2%
肝機能	実施者数	647	20 226	32 445	37 984	32 901	14 202	1 870	140 275
	有所見者数	91	3 938	8 775	12 615	10 461	3 852	388	40 120
	有所見率	14.1%	19.5%	27.0%	33.2%	31.8%	27.1%	20.7%	28.6%
血中脂質	実施者数	1 538	19 901	31 929	37 623	32 672	14 150	1 847	139 660
	有所見者数	125	4 574	11 630	18 139	16 385	6 451	712	58 016
	有所見率	8.1%	23.0%	36.4%	48.2%	50.1%	45.6%	38.5%	41.5%
血糖	実施者数	634	18 646	30 517	37 609	32 662	14 152	1 869	136 089
	有所見者数	11	368	1 448	5 394	8 806	5 156	719	21 902
	有所見率	1.7%	2.0%	4.7%	14.3%	27.0%	36.4%	38.5%	16.1%
尿糖	実施者数	5 854	30 856	41 323	44 031	37 394	15 585	1 970	177 013
	有所見者数	19	120	420	1 185	1 801	985	117	4 647
	有所見率	0.3%	0.4%	1.0%	2.7%	4.8%	6.3%	5.9%	2.6%
尿蛋白	実施者数	5 854	30 858	41 333	44 052	37 405	15 592	1 970	177 064
	有所見者数	167	445	605	1 026	1 257	851	151	4 502
	有所見率	2.9%	1.4%	1.5%	2.3%	3.4%	5.5%	7.7%	2.5%
心電図	実施者数	3 166	13 477	22 775	36 962	32 278	14 054	1 783	124 495
	有所見者数	880	1 040	1 006	3 174	4 628	3 048	543	14 319
	有所見率	27.8%	7.7%	4.4%	8.6%	14.3%	21.7%	30.5%	11.5%

表 3-2 年齢階層別有所見者数及び有所見率（女）

		～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～	全年齢
受診者数		2 705	16 678	17 124	20 215	17 729	7 561	1 049	83 061
有所見者数		575	3 374	5 453	10 290	12 205	5 837	844	38 578
有所見率		21.3%	20.2%	31.8%	50.9%	68.8%	77.2%	80.5%	46.4%
医師の指示人数		110	1 075	1 765	3 678	4 409	2 480	362	13 879
指示率		4.1%	6.4%	10.3%	18.2%	24.9%	32.8%	34.5%	16.7%
聴力（1000H z）	実施者数	595	7 161	9 842	17 574	15 683	6 454	828	58 137
	有所見者数	3	42	111	339	539	665	222	1 921
	有所見率	0.5%	0.6%	1.1%	1.9%	3.4%	10.3%	26.8%	3.3%
聴力（4000H z）	実施者数	595	7 161	9 842	17 574	15 683	6 454	828	58 137
	有所見者数	3	43	98	272	448	563	214	1 641
	有所見率	0.5%	0.6%	1.0%	1.5%	2.9%	8.7%	25.8%	2.8%
聴力その他	実施者数	150	8 051	6 835	1 189	685	281	49	17 240
	有所見者数	－	6	7	3	1	－	－	17
	有所見率	－	0.1%	0.1%	0.3%	0.1%	－	－	0.1%
胸部X線	実施者数	2 162	15 344	14 724	18 223	16 199	6 929	972	74 553
	有所見者数	41	281	764	2 254	3 483	1 960	374	9 157
	有所見率	1.9%	1.8%	5.2%	12.4%	21.5%	28.3%	38.5%	12.3%
血圧	実施者数	2 678	16 583	16 836	19 364	16 866	7 087	952	80 366
	有所見者数	19	76	287	1 204	1 909	1 114	186	4 795
	有所見率	0.7%	0.5%	1.7%	6.2%	11.3%	15.7%	19.5%	6.0%
貧血	実施者数	621	13 104	15 162	18 481	16 244	6 722	887	71 221
	有所見者数	34	881	1 568	2 534	783	146	55	6 001
	有所見率	5.5%	6.7%	10.3%	13.7%	4.8%	2.2%	6.2%	8.4%
肝機能	実施者数	220	12 682	15 118	18 495	16 363	6 905	907	70 690
	有所見者数	3	386	642	1 235	2 006	809	103	5 184
	有所見率	1.4%	3.0%	4.2%	6.7%	12.3%	11.7%	11.4%	7.3%
血中脂質	実施者数	429	12 569	14 967	18 404	16 326	6 891	886	70 472
	有所見者数	29	1 087	2 178	4 072	6 519	3 120	350	17 355
	有所見率	6.8%	8.6%	14.6%	22.1%	39.9%	45.3%	39.5%	24.6%
血糖	実施者数	218	10 784	13 611	18 405	16 332	6 899	907	67 156
	有所見者数	7	277	698	2 088	3 229	1 807	243	8 349
	有所見率	3.2%	2.6%	5.1%	11.3%	19.8%	26.2%	26.8%	12.4%
尿糖	実施者数	2 500	16 446	16 776	19 105	16 761	7 075	944	79 607
	有所見者数	10	81	134	154	214	137	27	757
	有所見率	0.4%	0.5%	0.8%	0.8%	1.3%	1.9%	2.9%	1.0%
尿蛋白	実施者数	2 512	16 447	16 780	19 115	16 772	7 076	944	79 646
	有所見者数	101	500	385	412	290	140	23	1 851
	有所見率	4.0%	3.0%	2.3%	2.2%	1.7%	2.0%	2.4%	2.3%
心電図	実施者数	1 312	6 861	9 774	17 758	15 840	6 588	846	58 979
	有所見者数	375	360	358	1 166	1 804	936	152	5 151
	有所見率	28.6%	5.2%	3.7%	6.6%	11.4%	14.2%	18.0%	8.7%