

# 一 般 健 康 診 断

表1 一般健康診断等の種類別受診者及び受診団体数

## 1-1 一般健康診断

| 区 分    | 総 数     |       | 一 般 健 康 診 断        |                     |        |       |         | 一般健康診断時に行うその他の健診   |                    |                             |
|--------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------|-------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|        | 受診者     | 受診団体  | 全項目等 <sup>1)</sup> | 省略項目等 <sup>2)</sup> | その他    | 雇入れ時  | 計       | 総合健診 <sup>3)</sup> | 婦人健診 <sup>4)</sup> | その他の <sup>5)</sup><br>検診・検査 |
| 2023年度 | 237 961 | 1 933 | 162 235            | 28 300              | 33 699 | 3 705 | 227 939 | —                  | —                  | 10 022                      |
| 2022年度 | 265 156 | 1 943 | 167 984            | 42 488              | 42 146 | 3 871 | 256 489 | 776                | —                  | 7 891                       |
| 2021年度 | 269 902 | 1 912 | 104 897            | 42 846              | 57 006 | 2 961 | 207 710 | 53 994             | 24                 | 8 174                       |

※受診者は延数、受診団体は実数（代表団体）

1) 全項目とは労働安全衛生規則で定められた35歳及び40歳以上の者の健診及び項目を追加して実施した健診

2) 省略項目とは労働安全衛生規則で認められた一部項目を省略して行った健診及び項目を追加して実施した健診

3) 総合健診とは一般健診に消化器検診を加えて行った健診

4) 婦人健診とは女性を対象とした協会のセット健診（子宮がん、乳がん、循環器、貧血など20項目）但し、子宮がん、乳がん検診結果については別掲

5) その他の検診・検査とは健康診断項目の一部を受託して実施した検診検査

## 1-2 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

| 区 分    | 総 数    |       | 一 般 健 診 |               |                 | 子宮頸がん検診<br>(単独) | 付加健診 | ステップアップ<br>検 査 |
|--------|--------|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|------|----------------|
|        | 受診者数   | 受診団体  | 健康診断    | 乳がん検診<br>(併用) | 子宮頸がん検診<br>(併用) |                 |      |                |
| 2023年度 | 22 247 | 2 398 | 21 866  | 547           | 1 802           | 381             | 674  | 267            |
| 2022年度 | 26 056 | 2 349 | 25 629  | 694           | 2 029           | 427             | 689  | 325            |
| 2021年度 | 24 251 | 2 310 | 23 819  | 813           | 2 113           | 432             | 669  | 297            |

表2 検査結果

## 2-1 血圧

## 男

| 区 分     | 受診者     | 最大血圧          |      | 最小血圧          |      | (正常域)<br>～139<br>及び～89 |      | (境界域)<br>140～159<br>又は90～99 |      | (高血圧)<br>160～<br>又は100～ |     |
|---------|---------|---------------|------|---------------|------|------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|-----|
|         |         | 平均値<br>(mmHg) | 標準偏差 | 平均値<br>(mmHg) | 標準偏差 | 数                      | %    | 数                           | %    | 数                       | %   |
|         |         |               |      |               |      |                        |      |                             |      |                         |     |
| ～ 29 歳  | 23 382  | 117.0         | 12.0 | 66.9          | 9.4  | 22 798                 | 97.5 | 524                         | 2.2  | 60                      | 0.3 |
| 30 ～ 39 | 31 442  | 118.6         | 12.9 | 71.9          | 10.4 | 29 534                 | 93.9 | 1 464                       | 4.7  | 444                     | 1.4 |
| 40 ～ 49 | 31 939  | 121.1         | 14.2 | 77.0          | 11.4 | 27 615                 | 86.5 | 3 110                       | 9.7  | 1 214                   | 3.8 |
| 50 ～ 59 | 36 719  | 124.4         | 14.7 | 80.4          | 11.0 | 29 169                 | 79.4 | 5 542                       | 15.1 | 2 008                   | 5.5 |
| 60 歳 ～  | 20 093  | 127.4         | 15.5 | 79.5          | 10.7 | 15 463                 | 77.0 | 3 633                       | 18.1 | 997                     | 5.0 |
| 計       | 143 575 | 121.6         | 14.3 | 75.4          | 11.7 | 124 579                | 86.8 | 14 273                      | 9.9  | 4 723                   | 3.3 |

## 女

| 区 分     | 受診者    | 最大血圧          |      | 最小血圧          |      | (正常域)<br>～139<br>及び～89 |      | (境界域)<br>140～159<br>又は90～99 |      | (高血圧)<br>160～<br>又は100～ |     |
|---------|--------|---------------|------|---------------|------|------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|-----|
|         |        | 平均値<br>(mmHg) | 標準偏差 | 平均値<br>(mmHg) | 標準偏差 | 数                      | %    | 数                           | %    | 数                       | %   |
|         |        |               |      |               |      |                        |      |                             |      |                         |     |
| ～ 29 歳  | 16 123 | 107.0         | 11.3 | 63.3          | 8.6  | 16 033                 | 99.4 | 73                          | 0.5  | 17                      | 0.1 |
| 30 ～ 39 | 15 018 | 108.1         | 12.8 | 65.3          | 9.8  | 14 739                 | 98.1 | 219                         | 1.5  | 60                      | 0.4 |
| 40 ～ 49 | 16 666 | 112.9         | 15.0 | 69.1          | 11.5 | 15 667                 | 94.0 | 755                         | 4.5  | 244                     | 1.5 |
| 50 ～ 59 | 19 262 | 117.9         | 16.3 | 72.5          | 11.7 | 17 273                 | 89.7 | 1 565                       | 8.1  | 424                     | 2.2 |
| 60 歳 ～  | 10 385 | 123.1         | 17.0 | 73.5          | 11.2 | 8 772                  | 84.5 | 1 311                       | 12.6 | 302                     | 2.9 |
| 計       | 77 454 | 113.4         | 15.6 | 68.6          | 11.3 | 72 484                 | 93.6 | 3 923                       | 5.1  | 1 047                   | 1.4 |

## 2-2 BMI

## 男

| 区 分   | 受診者     | 平均値  | 標準偏差 | ～18.4 |     | 18.5～24.9 |      | 25.0～29.9 |      | 30.0～34.9 |     | 35.0～39.9 |     | 40.0～ |     |
|-------|---------|------|------|-------|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-----|
|       |         |      |      | 数     | %   | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %   | 数         | %   | 数     | %   |
| ～29歳  | 23 300  | 22.6 | 3.7  | 1 989 | 8.5 | 16 562    | 71.1 | 3 696     | 15.9 | 793       | 3.4 | 199       | 0.9 | 61    | 0.3 |
| 30～39 | 31 416  | 23.7 | 4.0  | 1 521 | 4.8 | 20 380    | 64.9 | 7 281     | 23.2 | 1 686     | 5.4 | 422       | 1.3 | 126   | 0.4 |
| 40～49 | 31 920  | 24.2 | 3.9  | 906   | 2.8 | 19 955    | 62.5 | 8 587     | 26.9 | 1 934     | 6.1 | 423       | 1.3 | 115   | 0.4 |
| 50～59 | 36 717  | 24.4 | 3.8  | 876   | 2.4 | 21 776    | 59.3 | 11 130    | 30.3 | 2 406     | 6.6 | 441       | 1.2 | 88    | 0.2 |
| 60歳～  | 20 071  | 24.0 | 3.4  | 623   | 3.1 | 12 554    | 62.5 | 5 852     | 29.2 | 914       | 4.6 | 115       | 0.6 | 13    | 0.1 |
| 計     | 143 424 | 23.9 | 3.8  | 5 915 | 4.1 | 91 227    | 63.6 | 36 546    | 25.5 | 7 733     | 5.4 | 1 600     | 1.1 | 403   | 0.3 |

## 女

| 区 分   | 受診者    | 平均値  | 標準偏差 | ～18.4  |      | 18.5～24.9 |      | 25.0～29.9 |      | 30.0～34.9 |     | 35.0～39.9 |     | 40.0～ |     |
|-------|--------|------|------|--------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-----|
|       |        |      |      | 数      | %    | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %   | 数         | %   | 数     | %   |
| ～29歳  | 16 111 | 20.9 | 3.3  | 3 103  | 19.3 | 11 490    | 71.3 | 1 151     | 7.1  | 261       | 1.6 | 89        | 0.6 | 17    | 0.1 |
| 30～39 | 15 005 | 21.7 | 3.8  | 2 318  | 15.4 | 10 397    | 69.3 | 1 681     | 11.2 | 476       | 3.2 | 90        | 0.6 | 43    | 0.3 |
| 40～49 | 16 590 | 22.3 | 4.0  | 2 133  | 12.9 | 11 184    | 67.4 | 2 423     | 14.6 | 656       | 4.0 | 152       | 0.9 | 42    | 0.3 |
| 50～59 | 19 200 | 22.6 | 4.1  | 2 422  | 12.6 | 12 370    | 64.4 | 3 275     | 17.1 | 873       | 4.5 | 206       | 1.1 | 54    | 0.3 |
| 60歳～  | 10 388 | 22.4 | 3.8  | 1 320  | 12.7 | 6 849     | 65.9 | 1 769     | 17.0 | 371       | 3.6 | 69        | 0.7 | 10    | 0.1 |
| 計     | 77 294 | 22.0 | 3.9  | 11 296 | 14.6 | 52 290    | 67.7 | 10 299    | 13.3 | 2 637     | 3.4 | 606       | 0.8 | 166   | 0.2 |

## 2-3 腹囲

## 男

| 区 分   | 受診者     | 平均値<br>(cm) | 標準<br>偏差 | ～74.9  |      | 75.0～79.9 |      | 80.0～84.9 |      | 85.0～89.9 |      | 90.0～94.9 |      | 95.0～99.9 |     | 100.0～ |     |
|-------|---------|-------------|----------|--------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|--------|-----|
|       |         |             |          | 数      | %    | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %   | 数      | %   |
| ～29歳  | 17 232  | 77.3        | 9.5      | 7 992  | 46.4 | 3 918     | 22.7 | 2 392     | 13.9 | 1 299     | 7.5  | 741       | 4.3  | 407       | 2.4 | 483    | 2.8 |
| 30～39 | 25 297  | 81.6        | 10.5     | 7 029  | 27.8 | 5 485     | 21.7 | 5 036     | 19.9 | 3 235     | 12.8 | 1 916     | 7.6  | 1 183     | 4.7 | 1 413  | 5.6 |
| 40～49 | 31 416  | 83.4        | 10.2     | 6 094  | 19.4 | 6 368     | 20.3 | 7 121     | 22.7 | 4 978     | 15.8 | 3 050     | 9.7  | 1 830     | 5.8 | 1 975  | 6.3 |
| 50～59 | 36 037  | 84.8        | 9.9      | 5 204  | 14.4 | 6 442     | 17.9 | 8 585     | 23.8 | 6 354     | 17.6 | 4 311     | 12.0 | 2 589     | 7.2 | 2 552  | 7.1 |
| 60歳～  | 19 594  | 84.6        | 9.2      | 2 593  | 13.2 | 3 447     | 17.6 | 4 891     | 25.0 | 3 742     | 19.1 | 2 437     | 12.4 | 1 392     | 7.1 | 1 092  | 5.6 |
| 計     | 129 576 | 82.8        | 10.2     | 28 912 | 22.3 | 25 660    | 19.8 | 28 025    | 21.6 | 19 608    | 15.1 | 12 455    | 9.6  | 7 401     | 5.7 | 7 515  | 5.8 |

## 女

| 区 分   | 受診者    | 平均値<br>(cm) | 標準<br>偏差 | ～74.9  |      | 75.0～79.9 |      | 80.0～84.9 |      | 85.0～89.9 |      | 90.0～94.9 |     | 95.0～99.9 |     | 100.0～ |     |
|-------|--------|-------------|----------|--------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----|--------|-----|
|       |        |             |          | 数      | %    | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %    | 数         | %   | 数         | %   | 数      | %   |
| ～29歳  | 10 269 | 69.6        | 7.8      | 8 435  | 82.1 | 942       | 9.2  | 396       | 3.9  | 239       | 2.3  | 113       | 1.1 | 74        | 0.7 | 70     | 0.7 |
| 30～39 | 10 844 | 73.2        | 9.3      | 7 085  | 65.3 | 1 709     | 15.8 | 911       | 8.4  | 537       | 5.0  | 277       | 2.6 | 162       | 1.5 | 163    | 1.5 |
| 40～49 | 15 793 | 75.3        | 10.0     | 8 763  | 55.5 | 2 766     | 17.5 | 1 829     | 11.6 | 1 113     | 7.0  | 610       | 3.9 | 360       | 2.3 | 352    | 2.2 |
| 50～59 | 18 358 | 77.6        | 10.8     | 8 351  | 45.5 | 3 374     | 18.4 | 2 628     | 14.3 | 1 801     | 9.8  | 958       | 5.2 | 588       | 3.2 | 658    | 3.6 |
| 60歳～  | 10 005 | 78.3        | 10.3     | 4 028  | 40.3 | 1 971     | 19.7 | 1 646     | 16.5 | 1 094     | 10.9 | 635       | 6.3 | 323       | 3.2 | 308    | 3.1 |
| 計     | 65 269 | 75.2        | 10.3     | 36 662 | 56.2 | 10 762    | 16.5 | 7 410     | 11.4 | 4 784     | 7.3  | 2 593     | 4.0 | 1 507     | 2.3 | 1 551  | 2.4 |

## 2-4 貧血

## 男

| 区 分     | 受診者     | 異常なし   |      | ほぼ正常 |     | 要経過観察  |      | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |     |
|---------|---------|--------|------|------|-----|--------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|         |         | 数      | %    | 数    | %   | 数      | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   |
| ～ 29 歳  | 17 477  | 15 125 | 86.5 | 131  | 0.7 | 2 145  | 12.3 | 53    | 0.3 | 20    | 0.1 | 3     | 0.0 |
| 30 ～ 39 | 24 926  | 21 676 | 87.0 | 167  | 0.7 | 2 908  | 11.7 | 126   | 0.5 | 44    | 0.2 | 5     | 0.0 |
| 40 ～ 49 | 25 189  | 21 642 | 85.9 | 119  | 0.5 | 3 213  | 12.8 | 150   | 0.6 | 48    | 0.2 | 17    | 0.1 |
| 50 ～ 59 | 29 137  | 24 064 | 82.6 | 115  | 0.4 | 4 482  | 15.4 | 292   | 1.0 | 144   | 0.5 | 40    | 0.1 |
| 60 歳 ～  | 16 809  | 12 813 | 76.2 | 38   | 0.2 | 3 294  | 19.6 | 442   | 2.6 | 175   | 1.0 | 47    | 0.3 |
| 計       | 113 538 | 95 320 | 84.0 | 570  | 0.5 | 16 042 | 14.1 | 1 063 | 0.9 | 431   | 0.4 | 112   | 0.1 |

## 女

| 区 分     | 受診者    | 異常なし   |      | ほぼ正常 |     | 要経過観察 |      | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |     |
|---------|--------|--------|------|------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|         |        | 数      | %    | 数    | %   | 数     | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   |
| ～ 29 歳  | 13 018 | 10 775 | 82.8 | 16   | 0.1 | 1 462 | 11.2 | 561   | 4.3 | 148   | 1.1 | 56    | 0.4 |
| 30 ～ 39 | 12 693 | 10 010 | 78.9 | 15   | 0.1 | 1 491 | 11.7 | 757   | 6.0 | 299   | 2.4 | 121   | 1.0 |
| 40 ～ 49 | 13 933 | 10 503 | 75.4 | 20   | 0.1 | 1 695 | 12.2 | 925   | 6.6 | 546   | 3.9 | 244   | 1.8 |
| 50 ～ 59 | 15 904 | 12 862 | 80.9 | 28   | 0.2 | 2 110 | 13.3 | 520   | 3.3 | 216   | 1.4 | 168   | 1.1 |
| 60 歳 ～  | 8 784  | 7 434  | 84.6 | 9.0  | 0.1 | 1 002 | 11.4 | 260   | 3.0 | 48    | 0.5 | 31    | 0.4 |
| 計       | 64 332 | 51 584 | 80.2 | 88   | 0.1 | 7 760 | 12.1 | 3 023 | 4.7 | 1 257 | 2.0 | 620   | 1.0 |

※血色素量・赤血球数を実施している者を対象とする

## 2-5 肝機能

## 男

| 区 分     | 受診者     | 異常なし   |      | ほぼ正常 |     | 要経過観察  |      | 要二次検査  |      | 要 受 診 |     | 受 診 中 |     |
|---------|---------|--------|------|------|-----|--------|------|--------|------|-------|-----|-------|-----|
|         |         | 数      | %    | 数    | %   | 数      | %    | 数      | %    | 数     | %   | 数     | %   |
| ～ 29 歳  | 18 917  | 14 471 | 76.5 | 89   | 0.5 | 2 480  | 13.1 | 1 508  | 8.0  | 354   | 1.9 | 15    | 0.1 |
| 30 ～ 39 | 26 724  | 18 148 | 67.9 | 214  | 0.8 | 4 657  | 17.4 | 3 019  | 11.3 | 640   | 2.4 | 46    | 0.2 |
| 40 ～ 49 | 27 327  | 17 448 | 63.8 | 203  | 0.7 | 5 811  | 21.3 | 3 167  | 11.6 | 612   | 2.2 | 86    | 0.3 |
| 50 ～ 59 | 31 763  | 20 679 | 65.1 | 244  | 0.8 | 6 866  | 21.6 | 3 074  | 9.7  | 741   | 2.3 | 159   | 0.5 |
| 60 歳 ～  | 18 025  | 12 678 | 70.3 | 96   | 0.5 | 3 370  | 18.7 | 1 390  | 7.7  | 354   | 2.0 | 137   | 0.8 |
| 計       | 122 756 | 83 424 | 68.0 | 846  | 0.7 | 23 184 | 18.9 | 12 158 | 9.9  | 2 701 | 2.2 | 443   | 0.4 |

## 女

| 区 分     | 受診者    | 異常なし   |      | ほぼ正常 |     | 要経過観察 |      | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |     |
|---------|--------|--------|------|------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|         |        | 数      | %    | 数    | %   | 数     | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   |
| ～ 29 歳  | 13 851 | 13 151 | 94.9 | 10   | 0.1 | 476   | 3.4  | 163   | 1.2 | 45    | 0.3 | 6     | 0.0 |
| 30 ～ 39 | 13 600 | 12 594 | 92.6 | 14   | 0.1 | 691   | 5.1  | 220   | 1.6 | 71    | 0.5 | 10    | 0.1 |
| 40 ～ 49 | 15 166 | 13 593 | 89.6 | 18   | 0.1 | 1 097 | 7.2  | 341   | 2.2 | 94    | 0.6 | 23    | 0.2 |
| 50 ～ 59 | 17 648 | 14 516 | 82.3 | 34   | 0.2 | 2 100 | 11.9 | 662   | 3.8 | 290   | 1.6 | 46    | 0.3 |
| 60 歳 ～  | 9 778  | 8 076  | 82.6 | 18   | 0.2 | 1 125 | 11.5 | 356   | 3.6 | 154   | 1.6 | 49    | 0.5 |
| 計       | 70 043 | 61 930 | 88.4 | 94   | 0.1 | 5 489 | 7.8  | 1 742 | 2.5 | 654   | 0.9 | 134   | 0.2 |

※AST (GOT). ALT (GPT).  $\gamma$ -GTPについて検査した者を対象とする

## 2-6 脂質

### 男

| 区 分     | 受診者     | 異常なし   |      | ほぼ正常  |     | 要経過観察  |      | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |      |
|---------|---------|--------|------|-------|-----|--------|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|
|         |         | 数      | %    | 数     | %   | 数      | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %    |
| ～ 29 歳  | 18 035  | 12 373 | 68.6 | 222   | 1.2 | 4 426  | 24.5 | 833   | 4.6 | 142   | 0.8 | 39    | 0.2  |
| 30 ～ 39 | 25 676  | 14 100 | 54.9 | 565   | 2.2 | 8 210  | 32.0 | 2 002 | 7.8 | 478   | 1.9 | 321   | 1.3  |
| 40 ～ 49 | 26 679  | 11 899 | 44.6 | 924   | 3.5 | 9 715  | 36.4 | 2 304 | 8.6 | 607   | 2.3 | 1 230 | 4.6  |
| 50 ～ 59 | 31 267  | 12 423 | 39.7 | 1 390 | 4.4 | 10 917 | 34.9 | 2 384 | 7.6 | 668   | 2.1 | 3 485 | 11.1 |
| 60 歳 ～  | 17 424  | 6 934  | 39.8 | 793   | 4.6 | 5 459  | 31.3 | 1 050 | 6.0 | 183   | 1.1 | 3 005 | 17.2 |
| 計       | 119 081 | 57 729 | 48.5 | 3 894 | 3.3 | 38 727 | 32.5 | 8 573 | 7.2 | 2 078 | 1.7 | 8 080 | 6.8  |

### 女

| 区 分     | 受診者    | 異常なし   |      | ほぼ正常  |     | 要経過観察  |      | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |      |
|---------|--------|--------|------|-------|-----|--------|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|
|         |        | 数      | %    | 数     | %   | 数      | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %    |
| ～ 29 歳  | 13 168 | 10 636 | 80.8 | 345   | 2.6 | 1 750  | 13.3 | 355   | 2.7 | 56    | 0.4 | 26    | 0.2  |
| 30 ～ 39 | 12 969 | 9 569  | 73.8 | 437   | 3.4 | 2 254  | 17.4 | 501   | 3.9 | 116   | 0.9 | 92    | 0.7  |
| 40 ～ 49 | 14 623 | 9 592  | 65.6 | 832   | 5.7 | 3 194  | 21.8 | 627   | 4.3 | 126   | 0.9 | 252   | 1.7  |
| 50 ～ 59 | 16 758 | 7 068  | 42.2 | 1 500 | 9.0 | 5 100  | 30.4 | 1 503 | 9.0 | 418   | 2.5 | 1 169 | 7.0  |
| 60 歳 ～  | 9 295  | 3 021  | 32.5 | 884   | 9.5 | 2 825  | 30.4 | 765   | 8.2 | 192   | 2.1 | 1 608 | 17.3 |
| 計       | 66 813 | 39 886 | 59.7 | 3 998 | 6.0 | 15 123 | 22.6 | 3 751 | 5.6 | 908   | 1.4 | 3 147 | 4.7  |

※LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドについて検査した者を対象とする

## 2-7 選別聴力

### 男

| 区 分       | 総 数     |       | 年 代    |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|           |         |       | ～29歳   |       | 30～39  |       | 40～49  |       | 50～59  |       | 60歳～   |       |
|           | 数       | %     | 数      | %     | 数      | %     | 数      | %     | 数      | %     | 数      | %     |
| 総 数       | 108 640 | 100.0 | 12 743 | 100.0 | 19 170 | 100.0 | 27 326 | 100.0 | 31 572 | 100.0 | 17 829 | 100.0 |
| 所見あり総数    | 11 011  | 10.1  | 142    | 1.1   | 354    | 1.8   | 1 231  | 4.5   | 3 648  | 11.6  | 5 636  | 31.6  |
| 1 KHz のみ  | 1 498   | 1.4   | 38     | 0.3   | 76     | 0.4   | 225    | 0.8   | 534    | 1.7   | 625    | 3.5   |
| 4 KHz のみ  | 6 411   | 5.9   | 32     | 0.3   | 152    | 0.8   | 662    | 2.4   | 2 347  | 7.4   | 3 218  | 18.0  |
| 1.4KHz とも | 3 102   | 2.9   | 72     | 0.6   | 126    | 0.7   | 344    | 1.3   | 767    | 2.4   | 1 793  | 10.1  |
| 所見なし      | 97 629  | 89.9  | 12 601 | 98.9  | 18 816 | 98.2  | 26 095 | 95.5  | 27 924 | 88.4  | 12 193 | 68.4  |

### 女

| 区 分       | 総 数    |       | 年 代   |       |       |       |        |       |        |       |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
|           |        |       | ～29歳  |       | 30～39 |       | 40～49  |       | 50～59  |       | 60歳～  |       |
|           | 数      | %     | 数     | %     | 数     | %     | 数      | %     | 数      | %     | 数     | %     |
| 総 数       | 58 849 | 100.0 | 8 425 | 100.0 | 9 218 | 100.0 | 14 742 | 100.0 | 17 188 | 100.0 | 9 276 | 100.0 |
| 所見あり総数    | 2 948  | 5.0   | 90    | 1.1   | 131   | 1.4   | 361    | 2.4   | 899    | 5.2   | 1 467 | 15.8  |
| 1 KHz のみ  | 1 190  | 2.0   | 25    | 0.3   | 46    | 0.5   | 163    | 1.1   | 386    | 2.2   | 570   | 6.1   |
| 4 KHz のみ  | 768    | 1.3   | 20    | 0.2   | 36    | 0.4   | 77     | 0.5   | 239    | 1.4   | 396   | 4.3   |
| 1.4KHz とも | 990    | 1.7   | 45    | 0.5   | 49    | 0.5   | 121    | 0.8   | 274    | 1.6   | 501   | 5.4   |
| 所見なし      | 55 901 | 95.0  | 8 335 | 98.9  | 9 087 | 98.6  | 14 381 | 97.6  | 16 289 | 94.8  | 7 809 | 84.2  |

## 2-8 心電図

### 男

| 区 分   | 受診者     | 異常なし   |      | ほぼ正常   |      | 要経過観察  |      | 要二次検査 |     | 要受診 |     | 受診中   |     |
|-------|---------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
|       |         | 数      | %    | 数      | %    | 数      | %    | 数     | %   | 数   | %   | 数     | %   |
| ～29歳  | 14 129  | 11 090 | 78.5 | 2 432  | 17.2 | 554    | 3.9  | 37    | 0.3 | 4   | 0.0 | 12    | 0.1 |
| 30～39 | 20 971  | 16 631 | 79.3 | 3 321  | 15.8 | 905    | 4.3  | 57    | 0.3 | 15  | 0.1 | 42    | 0.2 |
| 40～49 | 27 390  | 20 777 | 75.9 | 4 235  | 15.5 | 2 103  | 7.7  | 103   | 0.4 | 38  | 0.1 | 134   | 0.5 |
| 50～59 | 31 711  | 22 150 | 69.8 | 5 162  | 16.3 | 3 541  | 11.2 | 179   | 0.6 | 124 | 0.4 | 555   | 1.8 |
| 60歳～  | 17 930  | 10 424 | 58.1 | 3 239  | 18.1 | 3 010  | 16.8 | 233   | 1.3 | 162 | 0.9 | 862   | 4.8 |
| 計     | 112 131 | 81 072 | 72.3 | 18 389 | 16.4 | 10 113 | 9.0  | 609   | 0.5 | 343 | 0.3 | 1 605 | 1.4 |

### 女

| 区 分   | 受診者    | 異常なし   |      | ほぼ正常  |      | 要経過観察 |      | 要二次検査 |     | 要受診 |     | 受診中 |     |
|-------|--------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |        | 数      | %    | 数     | %    | 数     | %    | 数     | %   | 数   | %   | 数   | %   |
| ～29歳  | 8 753  | 7 307  | 83.5 | 1 139 | 13.0 | 284   | 3.2  | 13    | 0.1 | 2   | 0.0 | 8   | 0.1 |
| 30～39 | 9 827  | 8 092  | 82.3 | 1 292 | 13.1 | 409   | 4.2  | 15    | 0.2 | 5   | 0.1 | 14  | 0.1 |
| 40～49 | 14 827 | 12 068 | 81.4 | 1 641 | 11.1 | 1 020 | 6.9  | 39    | 0.3 | 6   | 0.0 | 53  | 0.4 |
| 50～59 | 17 281 | 13 200 | 76.4 | 2 105 | 12.2 | 1 797 | 10.4 | 73    | 0.4 | 24  | 0.1 | 82  | 0.5 |
| 60歳～  | 9 309  | 6 231  | 66.9 | 1 407 | 15.1 | 1 421 | 15.3 | 53    | 0.6 | 31  | 0.3 | 166 | 1.8 |
| 計     | 59 997 | 46 898 | 78.2 | 7 584 | 12.6 | 4 931 | 8.2  | 193   | 0.3 | 68  | 0.1 | 323 | 0.5 |

## 2-9 眼底

### 男

| 区 分   | 受診者    | Keith-Wagener (KW) 分類 |        |    |      |      |     |       |    | 受診者    | Keith-Wagener (KW) 分類 |       |    |      |      |     |       |    |
|-------|--------|-----------------------|--------|----|------|------|-----|-------|----|--------|-----------------------|-------|----|------|------|-----|-------|----|
|       |        | 0                     | I      | II | II a | II b | III | III a | IV |        | 0                     | I     | II | II a | II b | III | III a | IV |
| ～29歳  | 111    | 109                   | 2      | —  | —    | —    | —   | —     | —  | 96     | 93                    | 3     | —  | —    | —    | —   | —     | —  |
| 30～39 | 3 952  | 3 878                 | 70     | —  | 2    | 2    | —   | —     | —  | 2 193  | 2 170                 | 20    | —  | 3    | —    | —   | —     | —  |
| 40～49 | 11 676 | 10 048                | 1 576  | —  | 35   | 12   | 5   | —     | —  | 6 296  | 5 792                 | 487   | —  | 9    | 5    | 3   | —     | —  |
| 50～59 | 14 088 | 6 134                 | 7 687  | —  | 196  | 61   | 10  | —     | —  | 7 582  | 4 538                 | 2 971 | —  | 59   | 11   | 3   | —     | —  |
| 60歳～  | 6 126  | 1 285                 | 4 626  | —  | 170  | 38   | 7   | —     | —  | 2 720  | 865                   | 1 789 | —  | 52   | 11   | 3   | —     | —  |
| 計     | 35 953 | 21 454                | 13 961 | —  | 403  | 113  | 22  | —     | —  | 18 887 | 13 458                | 5 270 | —  | 123  | 27   | 9   | —     | —  |

### 女

## 2-10 糖代謝

### 男

| 区 分   | 受診者     | 異常なし   |      | ほぼ正常  |     | 要経過観察  |      | 要二次検査 |     | 要受診   |     | 受診中   |      |
|-------|---------|--------|------|-------|-----|--------|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|
|       |         | 数      | %    | 数     | %   | 数      | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %    |
| ～29歳  | 18 033  | 17 106 | 94.9 | 98    | 0.5 | 739    | 4.1  | 40    | 0.2 | 29    | 0.2 | 21    | 0.1  |
| 30～39 | 25 680  | 22 816 | 88.8 | 259   | 1.0 | 2 114  | 8.2  | 197   | 0.8 | 135   | 0.5 | 159   | 0.6  |
| 40～49 | 26 684  | 21 709 | 81.4 | 372   | 1.4 | 3 153  | 11.8 | 594   | 2.2 | 304   | 1.1 | 552   | 2.1  |
| 50～59 | 31 280  | 21 503 | 68.7 | 483   | 1.5 | 5 583  | 17.8 | 1 281 | 4.1 | 623   | 2.0 | 1 807 | 5.8  |
| 60歳～  | 17 447  | 9 899  | 56.7 | 256   | 1.5 | 3 812  | 21.8 | 1 272 | 7.3 | 452   | 2.6 | 1 756 | 10.1 |
| 計     | 119 124 | 93 033 | 78.1 | 1 468 | 1.2 | 15 401 | 12.9 | 3 384 | 2.8 | 1 543 | 1.3 | 4 295 | 3.6  |

### 女

| 区 分   | 受診者    | 異常なし   |      | ほぼ正常 |     | 要経過観察  |      | 要二次検査 |     | 要受診 |     | 受診中 |     |
|-------|--------|--------|------|------|-----|--------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |        | 数      | %    | 数    | %   | 数      | %    | 数     | %   | 数   | %   | 数   | %   |
| ～29歳  | 13 177 | 12 378 | 93.9 | 33   | 0.3 | 702    | 5.3  | 31    | 0.2 | 11  | 0.1 | 22  | 0.2 |
| 30～39 | 12 977 | 11 442 | 88.2 | 60   | 0.5 | 1 333  | 10.3 | 66    | 0.5 | 29  | 0.2 | 47  | 0.4 |
| 40～49 | 14 624 | 12 102 | 82.8 | 103  | 0.7 | 2 069  | 14.1 | 177   | 1.2 | 69  | 0.5 | 104 | 0.7 |
| 50～59 | 16 766 | 11 448 | 68.3 | 105  | 0.6 | 4 219  | 25.2 | 496   | 3.0 | 155 | 0.9 | 343 | 2.0 |
| 60歳～  | 9 326  | 5 614  | 60.2 | 40   | 0.4 | 2 759  | 29.6 | 410   | 4.4 | 137 | 1.5 | 366 | 3.9 |
| 計     | 66 870 | 52 984 | 79.2 | 341  | 0.5 | 11 082 | 16.6 | 1 180 | 1.8 | 401 | 0.6 | 882 | 1.3 |

## 2-11 胸部X線

## 男

| 区 分     | 受診者     | 異常なし    |      | 年1回観察 |      | 要経過観察 |     | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |     |
|---------|---------|---------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|         |         | 数       | %    | 数     | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   |
| ～ 29 歳  | 19 851  | 19 422  | 97.8 | 253   | 1.3  | 135   | 0.7 | 28    | 0.1 | 12    | 0.1 | 1     | 0.0 |
| 30 ～ 39 | 26 918  | 25 489  | 94.7 | 881   | 3.3  | 476   | 1.8 | 63    | 0.2 | 7     | 0.0 | 2     | 0.0 |
| 40 ～ 49 | 27 006  | 24 313  | 90.0 | 1 808 | 6.7  | 711   | 2.6 | 150   | 0.6 | 15    | 0.1 | 9     | 0.0 |
| 50 ～ 59 | 31 174  | 26 540  | 85.1 | 3 243 | 10.4 | 1 087 | 3.5 | 262   | 0.8 | 25    | 0.1 | 17    | 0.1 |
| 60 歳 ～  | 17 851  | 14 222  | 79.7 | 2 324 | 13.0 | 881   | 4.9 | 356   | 2.0 | 17    | 0.1 | 51    | 0.3 |
| 計       | 122 800 | 109 986 | 89.6 | 8 509 | 6.9  | 3 290 | 2.7 | 859   | 0.7 | 76    | 0.1 | 80    | 0.1 |

## 女

| 区 分     | 受診者    | 異常なし   |      | 年1回観察 |      | 要経過観察 |     | 要二次検査 |     | 要 受 診 |     | 受 診 中 |     |
|---------|--------|--------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|         |        | 数      | %    | 数     | %    | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   | 数     | %   |
| ～ 29 歳  | 14 427 | 14 286 | 99.0 | 65    | 0.5  | 51    | 0.4 | 19    | 0.1 | 3     | 0.0 | 3     | 0.0 |
| 30 ～ 39 | 13 089 | 12 686 | 96.9 | 187   | 1.4  | 179   | 1.4 | 23    | 0.2 | 13    | 0.1 | 1     | 0.0 |
| 40 ～ 49 | 15 121 | 13 985 | 92.5 | 556   | 3.7  | 506   | 3.3 | 66    | 0.4 | 7     | 0.0 | 1     | 0.0 |
| 50 ～ 59 | 17 662 | 14 879 | 84.2 | 1 275 | 7.2  | 1 326 | 7.5 | 153   | 0.9 | 17    | 0.1 | 12    | 0.1 |
| 60 歳 ～  | 9 674  | 7 374  | 76.2 | 1 183 | 12.2 | 905   | 9.4 | 186   | 1.9 | 10    | 0.1 | 16    | 0.2 |
| 計       | 69 973 | 63 210 | 90.3 | 3 266 | 4.7  | 2 967 | 4.2 | 447   | 0.6 | 50    | 0.1 | 33    | 0.0 |

※心臓、大動脈等の異常で呼吸器系として問題のない所見は除く

## 〈参考〉 労働安全衛生規則第52条（様式第6号）報告する際の「有所見」の数え方

|    |                |                                                                                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 聴力検査（オーディオメータ） | 左右の1000Hz、4000Hzのいずれかで、規定レベルの音を聴取できず「所見あり」となった者                                     |
| 2  | 聴力検査（その他の方法）   | 会話聴力で異常の認められた者、及び補聴器使用中の者                                                           |
| 3  | 胸部エックス線検査      | 「異常なし」と判定された以外の者（肺、胸膜の治癒所見を含む）                                                      |
| 4  | 喀痰検査           | 「異常なし」と判定された以外の者                                                                    |
| 5  | 血圧             | （1）収縮期血圧 140mmHg以上の者<br>（2）拡張期血圧 90mmHg以上の者                                         |
| 6  | 貧血検査           | 血色素量が男で13.6g/dℓ以下、女で11.5g/dℓ以下の者                                                    |
| 7  | 肝機能検査          | （1）AST（GOT） 34U/l以上<br>（2）ALT（GPT） 33U/l以上<br>（3）γ-GTP 75U/l以上の者                    |
| 8  | 血中脂質検査         | （1）LDLコレステロール 140mg/dℓ以上の者<br>（2）HDLコレステロール 39mg/dℓ以下の者<br>（3）トリグリセライド 150mg/dℓ以上の者 |
| 9  | 血糖検査           | （1）空腹時血糖 110mg/dℓ以上の者<br>（2）随時血糖 140mg/dℓ以上の者<br>（3）HbA1C 6.0%以上の者                  |
| 10 | 尿検査（糖）         | +以上の者。（±は除く）                                                                        |
| 11 | 尿検査（蛋白）        | +以上の者。（±は除く）                                                                        |
| 12 | 心電図検査          | 判定において「異常なし」「心配なし」以外の者                                                              |
| 13 | 所見のあった者の人数     | 前記1～12の各項において、「有所見」となった者の実人数                                                        |
| 14 | 医師の指示人数        | 総合判定において、「要二次検査（要精検・再検）」「要受診」「受診中」とされた者                                             |

表3-1 年齢階層別有所見者数及び有所見率（男）

|             |       | ～19歳  | 20歳代   | 30歳代   | 40歳代   | 50歳代   | 60歳代   | 70歳～  | 全年齢     |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 受診者数        |       | 552   | 22 940 | 31 558 | 32 190 | 37 044 | 17 326 | 3 033 | 144 643 |
| 有所見者数       |       | 147   | 8 649  | 17 126 | 22 075 | 29 029 | 14 798 | 2 784 | 94 608  |
| 有所見率        |       | 26.6% | 37.7%  | 54.3%  | 68.6%  | 78.4%  | 85.4%  | 91.8% | 65.4%   |
| 医師の指示人数     |       | 56    | 3 054  | 7 195  | 10 444 | 17 543 | 10 602 | 2 160 | 51 054  |
| 指示率         |       | 10.1% | 13.3%  | 22.8%  | 32.4%  | 47.4%  | 61.2%  | 71.2% | 35.3%   |
| 聴力（1000H z） | 実施者数  | 343   | 12 563 | 19 304 | 27 434 | 31 678 | 15 210 | 2 672 | 109 204 |
|             | 有所見者数 | 7     | 104    | 203    | 572    | 1 307  | 1 594  | 829   | 4 616   |
|             | 有所見率  | 2.0%  | 0.8%   | 1.1%   | 2.1%   | 4.1%   | 10.5%  | 31.0% | 4.2%    |
| 聴力（4000H z） | 実施者数  | 338   | 12 405 | 19 170 | 27 326 | 31 572 | 15 160 | 2 669 | 108 640 |
|             | 有所見者数 | 10    | 94     | 278    | 1 006  | 3 114  | 3 507  | 1 504 | 9 513   |
|             | 有所見率  | 3.0%  | 0.8%   | 1.5%   | 3.7%   | 9.9%   | 23.1%  | 56.4% | 8.8%    |
| 聴力その他       | 実施者数  | 200   | 10 316 | 12 292 | 4 678  | 5 079  | 1 797  | 269   | 34 631  |
|             | 有所見者数 | 1     | 5      | 9      | 4      | 17     | 4      | 0     | 40      |
|             | 有所見率  | 0.5%  | 0.0%   | 0.1%   | 0.1%   | 0.3%   | 0.2%   | －     | 0.1%    |
| 胸部X線        | 実施者数  | 446   | 19 405 | 26 918 | 27 006 | 31 174 | 15 133 | 2 718 | 122 800 |
|             | 有所見者数 | 7     | 447    | 1 637  | 3 336  | 5 770  | 3 688  | 1 047 | 15 932  |
|             | 有所見率  | 1.6%  | 2.3%   | 6.1%   | 12.4%  | 18.5%  | 24.4%  | 38.5% | 13.0%   |
| 血圧          | 実施者数  | 522   | 22 860 | 31 442 | 31 939 | 36 719 | 17 105 | 2 988 | 143 575 |
|             | 有所見者数 | 9     | 664    | 2 061  | 4 642  | 8 142  | 4 088  | 689   | 20 295  |
|             | 有所見率  | 1.7%  | 2.9%   | 6.6%   | 14.5%  | 22.2%  | 23.9%  | 23.1% | 14.1%   |
| 貧血          | 実施者数  | 372   | 18 942 | 27 582 | 28 406 | 32 843 | 15 612 | 2 723 | 126 480 |
|             | 有所見者数 | 12    | 753    | 1 562  | 2 177  | 3 493  | 2 673  | 894   | 11 564  |
|             | 有所見率  | 3.2%  | 4.0%   | 5.7%   | 7.7%   | 10.6%  | 17.1%  | 32.8% | 9.1%    |
| 肝機能         | 実施者数  | 367   | 18 793 | 27 207 | 28 124 | 32 538 | 15 521 | 2 744 | 125 294 |
|             | 有所見者数 | 66    | 4 138  | 8 210  | 9 565  | 10 487 | 4 182  | 571   | 37 219  |
|             | 有所見率  | 18.0% | 22.0%  | 30.2%  | 34.0%  | 32.2%  | 26.9%  | 20.8% | 29.7%   |
| 血中脂質        | 実施者数  | 367   | 18 819 | 27 052 | 27 925 | 32 335 | 15 460 | 2 728 | 124 686 |
|             | 有所見者数 | 49    | 4 547  | 10 060 | 12 760 | 14 937 | 6 434  | 992   | 49 779  |
|             | 有所見率  | 13.4% | 24.2%  | 37.2%  | 45.7%  | 46.2%  | 41.6%  | 36.4% | 39.9%   |
| 血糖          | 実施者数  | 367   | 18 812 | 27 055 | 27 925 | 32 335 | 15 464 | 2 742 | 124 700 |
|             | 有所見者数 | 8     | 360    | 1 571  | 3 902  | 8 866  | 5 916  | 1 274 | 21 897  |
|             | 有所見率  | 2.2%  | 1.9%   | 5.8%   | 14.0%  | 27.4%  | 38.3%  | 46.5% | 17.6%   |
| 尿糖          | 実施者数  | 522   | 22 864 | 31 438 | 31 930 | 36 691 | 17 097 | 2 983 | 143 525 |
|             | 有所見者数 | 2     | 126    | 405    | 950    | 2 423  | 1 664  | 343   | 5 913   |
|             | 有所見率  | 0.4%  | 0.6%   | 1.3%   | 3.0%   | 6.6%   | 9.7%   | 11.5% | 4.1%    |
| 尿蛋白         | 実施者数  | 522   | 22 864 | 31 438 | 31 930 | 36 692 | 17 097 | 2 983 | 143 526 |
|             | 有所見者数 | 8     | 218    | 329    | 505    | 885    | 647    | 178   | 2 770   |
|             | 有所見率  | 1.5%  | 1.0%   | 1.0%   | 1.6%   | 2.4%   | 3.8%   | 6.0%  | 1.9%    |
| 心電図         | 実施者数  | 350   | 13 780 | 20 971 | 27 391 | 31 712 | 15 247 | 2 684 | 112 135 |
|             | 有所見者数 | 13    | 703    | 1 261  | 2 682  | 4 635  | 3 286  | 765   | 13 345  |
|             | 有所見率  | 3.7%  | 5.1%   | 6.0%   | 9.8%   | 14.6%  | 21.6%  | 28.5% | 11.9%   |

表3-2 年齢階層別有所見者数及び有所見率（女）

|             |       | ～19歳  | 20歳代   | 30歳代   | 40歳代   | 50歳代   | 60歳代  | 70歳～  | 全年齢    |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 受診者数        |       | 236   | 15 968 | 15 097 | 16 915 | 19 622 | 9 309 | 1 433 | 78 580 |
| 有所見者数       |       | 39    | 3 670  | 5 263  | 8 383  | 13 204 | 7 165 | 1 186 | 38 910 |
| 有所見率        |       | 16.5% | 23.0%  | 34.9%  | 49.6%  | 67.3%  | 77.0% | 82.8% | 49.5%  |
| 医師の指示人数     |       | 10    | 1 680  | 2 545  | 4 287  | 7 466  | 4 710 | 883   | 21 581 |
| 指示率         |       | 4.2%  | 10.5%  | 16.9%  | 25.3%  | 38.0%  | 50.6% | 61.6% | 27.5%  |
| 聴力（1000H z） | 実施者数  | 151   | 8 287  | 9 218  | 14 743 | 17 188 | 8 094 | 1 183 | 58 864 |
|             | 有所見者数 | 3     | 67     | 95     | 284    | 660    | 758   | 313   | 2 180  |
|             | 有所見率  | 2.0%  | 0.8%   | 1.0%   | 1.9%   | 3.8%   | 9.4%  | 26.5% | 3.7%   |
| 聴力（4000H z） | 実施者数  | 149   | 8 276  | 9 218  | 14 742 | 17 188 | 8 094 | 1 183 | 58 850 |
|             | 有所見者数 | 3     | 62     | 85     | 198    | 513    | 611   | 286   | 1 758  |
|             | 有所見率  | 2.0%  | 0.7%   | 0.9%   | 1.3%   | 3.0%   | 7.5%  | 24.2% | 3.0%   |
| 聴力その他       | 実施者数  | 77    | 7 599  | 5 775  | 1 503  | 1 532  | 533   | 45    | 17 064 |
|             | 有所見者数 | 0     | 1      | 2      | 0      | 1      | 0     | 0     | 4      |
|             | 有所見率  | －     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.1%   | －     | －     | 0.0%   |
| 胸部X線        | 実施者数  | 201   | 14 226 | 13 089 | 15 121 | 17 662 | 8 377 | 1 297 | 69 973 |
|             | 有所見者数 | 1     | 147    | 461    | 1 395  | 3 348  | 2 362 | 437   | 8 151  |
|             | 有所見率  | 0.5%  | 1.0%   | 3.5%   | 9.2%   | 19.0%  | 28.2% | 33.7% | 11.6%  |
| 血圧          | 実施者数  | 209   | 15 914 | 15 018 | 16 666 | 19 262 | 9 047 | 1 338 | 77 454 |
|             | 有所見者数 | 0     | 112    | 319    | 1 073  | 2 111  | 1 323 | 306   | 5 244  |
|             | 有所見率  | 0.0%  | 0.7%   | 2.1%   | 6.4%   | 11.0%  | 14.6% | 22.9% | 6.8%   |
| 貧血          | 実施者数  | 152   | 14 041 | 13 947 | 15 444 | 17 796 | 8 281 | 1 223 | 70 884 |
|             | 有所見者数 | 8     | 1 035  | 1 607  | 2 149  | 911    | 257   | 87    | 6 054  |
|             | 有所見率  | 5.3%  | 7.4%   | 11.5%  | 13.9%  | 5.1%   | 3.1%  | 7.1%  | 8.5%   |
| 肝機能         | 実施者数  | 151   | 13 895 | 13 834 | 15 534 | 18 052 | 8 618 | 1 298 | 71 382 |
|             | 有所見者数 | 7     | 542    | 766    | 1 202  | 2 465  | 1 155 | 139   | 6 276  |
|             | 有所見率  | 4.6%  | 3.9%   | 5.5%   | 7.7%   | 13.7%  | 13.4% | 10.7% | 8.8%   |
| 血中脂質        | 実施者数  | 149   | 13 854 | 13 764 | 15 446 | 17 955 | 8 600 | 1 284 | 71 052 |
|             | 有所見者数 | 14    | 1 373  | 2 198  | 3 154  | 6 556  | 3 285 | 458   | 17 038 |
|             | 有所見率  | 9.4%  | 9.9%   | 16.0%  | 20.4%  | 36.5%  | 38.2% | 35.7% | 24.0%  |
| 血糖          | 実施者数  | 149   | 13 859 | 13 771 | 15 446 | 17 961 | 8 610 | 1 298 | 71 094 |
|             | 有所見者数 | 3     | 318    | 642    | 1 513  | 3 884  | 2 670 | 500   | 9 530  |
|             | 有所見率  | 2.0%  | 2.3%   | 4.7%   | 9.8%   | 21.6%  | 31.0% | 38.5% | 13.4%  |
| 尿糖          | 実施者数  | 209   | 15 895 | 14 996 | 16 575 | 19 173 | 9 044 | 1 337 | 77 229 |
|             | 有所見者数 | 0     | 92     | 138    | 177    | 410    | 244   | 66    | 1 127  |
|             | 有所見率  | 0.0%  | 0.6%   | 0.9%   | 1.1%   | 2.1%   | 2.7%  | 4.9%  | 1.5%   |
| 尿蛋白         | 実施者数  | 209   | 15 895 | 14 996 | 16 575 | 19 173 | 9 044 | 1 337 | 77 229 |
|             | 有所見者数 | 2     | 349    | 247    | 258    | 228    | 132   | 29    | 1 245  |
|             | 有所見率  | 1.0%  | 2.2%   | 1.6%   | 1.6%   | 1.2%   | 1.5%  | 2.2%  | 1.6%   |
| 心電図         | 実施者数  | 132   | 8 621  | 9 827  | 14 834 | 17 299 | 8 145 | 1 198 | 60 056 |
|             | 有所見者数 | 7     | 361    | 501    | 1 201  | 2 070  | 1 346 | 251   | 5 737  |
|             | 有所見率  | 5.3%  | 4.2%   | 5.1%   | 8.1%   | 12.0%  | 16.5% | 21.0% | 9.6%   |