


# 検査説明 1

発泡剤（胃を膨らませるお薬）飲用のお願い



検査のため  
胃袋を膨ら  
ませます




ゲップが出そう  
になったら生唾  
を飲む様にして  
抑えます

## 発泡剤・バリウムを飲みます

●発泡剤はミニカップのバリウム 20 mlで飲みます


### ① 発泡剤




### ② バリウム 20 ml



顆粒の発泡剤は  
口に入れたあと  
直ぐにバリウム  
で飲み込んでく  
ださい



膨らむまで 30 秒待ちます



バリウム

残り 130ml を飲みます

## 検査説明 2

### それでは検査を始めます

- 検査中は、技師が動き方をアナウンスします
- アナウンスにしたがって、ご自身で動いて頂きます


動く→ 止まる→ 呼吸を止める  
(呼吸を楽にする)




胃にバリウムをつけるため、  
右回りで回転して頂きます

- 途中、頭側が下がります

肩にショルダーガード



手すいを 内側から  
しっかり握ってください



おなかの下に  
クッションをはさみます

## 検診で『要精密検査』と判定されたら…

- ① かかりつけの病院
- ② お近くの病院
- ③ 当施設（消化器外来）

等を、**必ず受診**して下さい



胃X線検査（バリウム検査）は  
**1年に1回**、少なくとも**2年**  
**に1回受診**することが推奨さ  
れています。

積極的に検査を受診して健康  
を維持しましょう！！



たしかめましょう健康

公益財団法人 神奈川県予防医学協会